ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
МУКОФАЛЬК
(Mucofalk®)

Рег.

Торговое название:
Мукофальк
Mucofalk®

Лекарственная форма: Гранулы апельсиновые для приготовления суспензии для приёма внутрь

СОСТАВ
5 г гранул (1 пакетик или 1 чайная ложка) содержат:
Порошок оболочек семян подорожника овального (Plantago ovata Forssk.) - 3,25 г
Вспомогательные вещества: сахароза, декстрин, кислота лимонная, натрия альгинат, натрия цитрат, натрия хлорид, натрия сахаринат, ароматизатор апельсиновый.
5 г гранул содержит количество усвояемых углеводов, соответствующих 0,064 хлебных единиц.

ОПИСАНИЕ
Гранулы светло-коричневого цвета с включениями из коричневых частичек кожуры и примыкающих клеток оболочки высушенных семян подорожника овального (Plantago ovata Forssk.).

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА
Слабительное средство растительного происхождения.
Код АТХ : А06АВ

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Гидрофильные волокна из оболочки семян подорожника удерживают жидкость в желудочно-кишечном тракте, за счет этого увеличивается объем и размягчается консистенция стула. Препарат восстанавливает нормальную функцию кишечника, регулируя его деятельность и облегчая пассаж кишечного содержимого.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Запор (в т.ч. при беременности), анальные трещины, геморрой, послеоперационный период при вмешательствах в аноректальной области (в целях создания более мягкой консистенции стула), функциональная диарея, синдром раздраженного кишечника.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная чувствительность к препарату, органические стриктуры желудочно-кишечного тракта, кишечная непроходимость, декомпенсированный сахарный диабет, детский возраст до 12 лет.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
Ограничений и противопоказаний по приёму препарата в период беременности и лактации нет.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Внутрь, взрослым и детям старше 12 лет – по 1 пакетику или 1 чайной ложке 2-6 раз в сутки. Перед употреблением 1 пакетик или 1 чайную ложку гранул высыпают в стакан, который медленно наполняют холодной водой (150 мл), размешивают и тотчас выпивают, затем запивают еще одним стаканом жидкости.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Аллергические реакции.
В первые дни лечения возможно усиление метеоризма и появление чувства переполнения в животе.

ПЕРЕДОЗИРОВКА
Случаев передозировки не выявлено.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Не следует назначать одновременно с противодиарейными препаратами, а также с препаратами, угнетающими моторику кишечника.
Следует соблюдать интервал в 30-60 минут между приемом Мукофалька и других препаратов.
У больных с инсулинозависимым диабетом может потребоваться уменьшение дозы инсулина.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
При приеме препарата следует выпивать не менее 1,5 л жидкости в сутки.

ФОРМА ВЫПУСКА
Гранулы апельсиновые для приготовления суспензии для приема внутрь по 5 г в пакетик из ламинированного материала бумага/полиэтилен/алюминий/полиэтилен. По 20 пакетиков вместе с инструкцией по применению в коробке картонной.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в сухом месте при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года. Препарат не должен использоваться после истечения срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Др. Фальк Фарма ГмбХ
Ляйненвеберштр. 5, 79108 Фрайбург, Германия
тел. +49 0761 1514-0; факс +49 0761 1514-356

Претензии и предложения направлять по адресу:
101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 9, стр. 1
тел./факс (495) 628-1491

Представитель фирмы доктор Х. Гюнтер

И.О. Директор ИДКЭЛС А.Н. Васильев