МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП 000155-310816
СОГЛАСОВАНО

ПОЛУДАН®

Регистрационный номер:
Торговое название: Полудан®
МНН или группировочное название: Полиаденилиловая кислота+Полиуридиловая кислота
Лекарственная форма: капли назальные
Состав
активное вещество:
полирибоаденилиловой кислоты калиевая соль (калия полирибоаденилат) - 0,05 мг;
полирибоуридиловой кислоты калиевая соль (калия полирибоуридилат) - 0,0535 мг;
вспомогательные вещества: натрия гидрофосфат (натрий фосфорнокислый 2-замещенный) – 2,0 мг; калия дигидрофосфат (калий фосфорнокислый 1-замещенный безводный) – 0,408 мг; динатрия эдетат (трилон Б) – 0,336 мг; натрия хлорид – 8,5 мг; вода для инъекций – до 1 мл.

Описание: прозрачная бесцветная жидкость

Фармакотерапевтическая группа: иммуностимулирующее средство
Код АТХ: L03AX

Фармакологические свойства
Фармакодинамика
Полудан® - биосинтетический полирибонуклеотидный комплекс полирибоаденилиловой и полирибоуридиловой кислот. Индуктор синтеза эндогенных интерферонов. Стимулирует образование в основном альфа-интерферона, в меньшей степени бета- и гамма-интерферона. Индуцирует синтез интерферона в лейкоцитах периферической крови, а также в тканях и органах, содержащих лимфоидные элементы. Высокий уровень интерферона поддерживается ежедневными введениями на протяжении всего курса. Обладает прямым антивирусным действием в отношении вирусов гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. Модулирует цитокиновый ответ при инфицировании клеток вирусом.
Фармакокинетика
Количественно определить содержание полирибонуклеотидного комплекса полирибоаденилиловой кислот в биологических жидкостях организма не представляется возможным, т.к. действие препарата происходит на клеточном уровне.

Показания к применению
Лечение гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в составе комплексной терапии.
В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Противопоказано, так как данные по применению препарата при беременности и период грудного вскармливания отсутствуют.

Способ применения и дозы
Интраназально.
Для лечения гриппа и других острых вирусных респираторных инфекций у взрослых по 2 капли в каждую ноздрю 5 раз в день в течение 5 дней в острый период заболевания – не позднее 24-48 часов с момента появления первых симптомов.
Если после лечения в течение 2-3 дней улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.
Строго соблюдайте способ применения и режим дозирования, указанные в данной инструкции.

Побочное действие
Аллергические реакции, чиханье, незначительное снижение артериального давления.
Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка
Данные по передозировке препарата отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
При одновременном применении препарата Полудан® с ферментными препаратами в связи с разрушающим действием ферментов на эндогенный интерферон, клиническая эффективность препарата Полудан® уменьшается.
Совместим с антибиотиками и лекарственными средствами для лечения вирусных инфекций.

Особые указания
Побочные явления носят транзиторный характер и исчезают после отмены препарата через 1-3 суток.
Внимательно прочтите инструкцию перед тем, как начать применение препарата. Сохраните инструкцию, она может понадобиться вновь. Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу. Лекарственное средство, которым Вы лечитесь предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами
Специальных исследований не проводилось. Нет данных об отрицательном влиянии препарата на способность управлять транспортными средства, механизмами.

Форма выпуска
Капли назальные 50 ЕД/мл. По 5 мл во флаконах стеклянных, герметически укупоренных пробками резиновыми с обкаткой с колпачками алюминиевыми. По 1 флакону в комплекте с 1 крышкой-капельницей вместе с инструкцией по применению в пачке из картона. По 3 флакона в комплекте с 3 крышками-капельницами вместе с инструкцией по применению в пачке с перегородками или специальными гнездами из картона.

По 100 флаконов в комплекте с 100 крышками-капельницами с равным количеством инструкций по применению в коробке из картона (для стационаров).

Условия хранения
При температуре не выше 30 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
2 года. Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Производитель:
ООО «ЛЭНС-Фарм», дочерняя компания ОАО «ВЕРОФАРМ».
Юридический адрес: Россия, 601125, Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, корпус 67.
Адрес производства и принятия претензий: Россия, 601125, Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, корпус 67 и корпус 95.
Тел./факс (49243) 7-17-53
или Россия, 308013, г. Белгород, ул. Рабочая, д. 14
Тел.: (4722) 21-32-26; факс: (4722) 21-34-71

Директор по развитию
ООО «ЛЭНС-Фарм» Дыровщикова С.М.