ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
ПОЛУДАН®

Регистрационный номер:

Торговое название: ПОЛУДАН®
Международное непатентованное название (МНН):

Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления глазных капель

Состав: Полирибоаденилловой кислоты калиевая соль (калия полирибоаденилат) 0,1 мг, полирибоуридиловой кислоты калиевая соль (калия полирибоуридилат) 0,107 мг;
Вспомогательные вещества: натрия гидрофосфата (натрия фосфорнокислого 2-замещенного) 2,0 мг, калия дигидрофосфата (калия фосфорнокислого 1-замещенного безводного) 0,408 мг, натрия хлорида 8,5 мг.

Описание: лиофилизат белого цвета
Фармакотерапевтическая группа: иммуностимулирующее средство

Код АТХ: [S01AD]

Фармакологические свойства
Полудан - биосинтетический полирибонуклеотидный комплекс полирибоаденилловой и полирибоуридиловой кислот. Индуктор синтеза эндогенного интерферона. Обладает выраженной противовирусной и иммуномодулирующей активностью.
Инстилляции стимулирует выработку эндогенного интерферона в сыворотке крови и в слезной жидкости, который определяется через 3 ч после введения.
Высокий уровень интерферона (110 ЕД/мл в крови и 75 ЕД/мл в слезной жидкости) поддерживается ежедневными введениями на протяжении всего курса, на второй день после прекращения введения практически не определяется (титр не превышает 10 ЕД/мл). Усиливает активность естественных киллерных клеток, исходно сниженных у больных офтальмогерпесом, а также других иммунокомпетентных клеток.

Показания к применению
Полудан назначают взрослым и детям при вирусных заболеваниях глаз: аденовирусный и герпетический конъюнктивит, поверхностный кератоконъюнктивит, кератит.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы
Местно.
Раствор Полудана, предназначенный для инстилляций в глаз, готовят путем растворения содержимого флакона в 2 мл воды для инъекций. Готовый раствор может быть использован в течение 7 дней, при условии хранения в холодильнике.
Применение у взрослых: закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 6-8 раз в сутки. По мере стихания воспалительных явлений число инстилляций сокращают до 3-4 раз в сутки.
Применение у детей: закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 3-4 раза в сутки. По мере стихания воспалительных явлений число инстилляций сокращают до 1-2 раз в сутки.
При отсутствии эффекта в течение 7 дней необходимо проконсультироваться с врачом на предмет субконъюнктивальных инъекций препарата.

Побочное действие
Аллергические реакции (зуд, ощущение инородного тела, усиление конъюнктивальной инъекции, возникновение отдельных фолликулов в нижней переходной складке).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
При одновременном применении Полудана с ферментными препаратами в связи с разрушающим действием ферментов на эндогенный интерферон, клиническая эффективность Полудана уменьшается.
Совместим с антибиотиками и лекарственными средствами для лечения вирусных инфекций.

Особые указания
Побочные явления исчезают самостоятельно после отмены препарата через 1-3 суток.

Форма выпуска
Лиофилизат для приготовления глазных капель 100 ЕД во флаконе объемом 5 мл. По 1 или 3 флакона в комплекте с 1 или 3 стерильными крышками – капельницами или без них и инструкцией по применению в пачки из картона.

Срок годности
4 года. Не использовать после истечения срока годности.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше +4 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек
По рецепту.

Производитель

ООО «ЛЭНС-Фарм», дочерняя компания ОАО «Верофарм»
Юридический адрес 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе д. 71
Адрес производства и принятия претензий: 601125, Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Вольгинский, корпус 95
Тел (49243) 7-17-53

Директор ИДКЭЛС,
Профессор Чельцов В.В.

Начальник Медицинского управления Скоблик Т.И.