ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

ПОЛУДАН®

Регистрационный номер
Торговое название: Полудан®
Международное непатентованное название (МНН):
Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления назальных капель.

Состав: Полирибоаденилловой кислоты калиевая соль (калия полирибоаденилат) 0,1 мг, полирибоуридиловой кислоты калиевая соль (калия полирибоуридилат) 0,107 мг;
Вспомогательные вещества: натрия гидрофосфата (натрия фосфорнокислого 2-замещенного) 2,0 мг, калия дигидрофосфата (калия фосфорнокислого 1-замещенного безводного) 0,408 мг, натрия хлорида 8,5 мг.

Описание: лиофилизат белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: Иммуностимулирующее средство.
Код по АТХ [S01AD]

Фармакологические свойства
Полудан - биосинтететический полирибонуклеотидный комплекс полирибоаденилловой и полирибоуридиловой кислот. Индуктор синтеза эндогенного интерферона и других цитокинов. Стимулирует образование в основном альфа - интерферона, в меньшей степени бета- и гамма- интерферона. Индуцирует синтез интерферона в лейкоцитах периферической крови, а также в тканях и органах, содержащих лимфоидные элементы. Высокий уровень интерферона поддерживается ежедневными введениями на протяжении всего курса. Обладает прямым антивирусным действием в отношении вирусов гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. Модулирует цитокиновый ответ при инфицировании клеток вирусом.

Показания к применению
Лечение гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы
Местно.
Препарат применяют у взрослых для лечения гриппа и других острых вирусных респираторных инфекций в виде капель в нос. Закапывать по 2 капли в каждую ноздрю 5 раз в день в течение 5 дней в острый период заболевания – не позднее 24-48 часов с момента появления первых симптомов.
Раствор Полудана® готовят путем растворения содержимого флакона (100ЕД) кипяченой водой до метки, указанной на этикетке.

Побочное действие
Редко возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
При одновременном применении Полудана® с ферментными препаратами в связи с разрушающим действием ферментов на эндогенный интерферон, клиническая эффективность Полудана® уменьшается. Совместим с антибиотиками и лекарственными средствами для лечения вирусных инфекций.

Особые указания
Побочные явления носят транзиторный характер и исчезают после отмены препарата через 1-3 сутки.

Форма выпуска
Лиофилизат для приготовления назальных капель 100 ЕД во флаконы объемом по 5 мл.
По 1 или 3 флакона в комплекте с 1 или 3 крышками–капельницами и инструкцией по применению в пачки из картона.

Срок годности
4 года. Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше +4 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек
По рецепту.

Производитель:
ООО «ЛЭНС-Фарм», дочерняя компания ОАО «Верофарм»
Юридический адрес 143000, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе д. 71
Адрес производства и принятия претензий: 601125, Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Вольгинский, корпус 95
Тел (49243) 7-17-53

Директор ИДКЭЛС,
профессор Чельцов В.В.

Начальник Медицинского
управления Скоблик Т.И.