


ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**ВИНИЛИН**



**Регистрационный номер:** ЛС-000216

**Торговое наименование:** Винилин

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** поливинокс

**Лекарственная форма:** жидкость для внутреннего и наружного применения

**Состав:** действующее вещество – поливинокс по 50 или 100 г.

**Описание:** густая, вязкая жидкость светло-желтого цвета, с характерным запахом. На воздухе не густеет и не высыхает.

**Фармакотерапевтическая группа:** антисептическое средство

**Код АТХ:** D08AX

**Фармакологические свойства.**

**Фармакодинамика:**

Оказывает антисептическое действие, способствует очищению ран, регенерации тканей и эпителизации. При приеме внутрь действует как обволакивающее, противовоспалительное и бактериостатическое средство.

**Фармакокинетика:**

Нет сведений.

**Показания к применению:**

Наружно: фурункулы, карбункулы, трофические язвы, гнойные раны, мастит, раны мягких тканей, ожоги и обморожения.

Внутри: в комплексном лечении эрозивно-язвенных заболеваний желудка и 12-перстной кишки, обострение хронических гастритов с повышенной секреторной функцией желудка.

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к поливиноксу, заболевания печени, желчного пузыря и почек, детский возраст до 18 лет, беременность, период грудного вскармливания.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания:**

Применение препарата противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания.

**Способ применения и дозы:**

Наружно: для смачивания салфеток и непосредственного нанесения на раневую поверхность в достаточном количестве 2-3 раза в день. Курс лечения от 5 до 18 дней в зависимости от тяжести заболевания.

Внутри: 1 раз в день через 5-6 ч после последнего приема пищи (рекомендуется легкий ужин в 18 ч и прием препарата в 23-24 ч); при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки – 1 чайная ложка в первый день, в последующие дни – по 1 десертной ложке; курс – 16-20 дней; при гастритах с повышенной секреторной функцией и выраженной изжоге – в первый день – 1 чайную ложку, далее – по 1 десертной ложке через день, курс – в течение 10-12 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

**Побочное действие:** аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**Передозировка:** о случаях передозировки не сообщалось

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:** не описаны

**Особые указания:** нет сведений

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:**

Не изучалось.

**Форма выпуска:**

Жидкость для внутреннего и наружного применения.

По 50 и 100 г во флаконы из стекломассы оранжевого цвета с винтовой горловиной. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного.

**Условия хранения:**

В хорошо укупоренной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:** 5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска:**

Отпускают без рецепта.

**Наименование и адрес предприятия-производителя/организация, принимающая претензии от потребителей:**

АО «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ», Россия

142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 1/4, стр. 1. т/ф (495) 702 93 84

**Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата:**


АО «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ», Россия

142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная д.1/22.

Генеральный директор

АО «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ»

Нефатов Н.А.



110926