

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА

ВИНИЛИН

Регистрационный номер: ЛП-003251

Торговое наименование препарата: Винилин

Международное непатентованное или группировочное наименование: поливинокс

Лекарственная форма: жидкость для наружного применения.

Состав:

действующее вещество: поливинокс – 50 г/100 г.

Описание:

Густая, вязкая жидкость светло-желтого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.

Код АТХ: D08AX.

Фармакологические свойства:

Обладает антисептическим действием, способствует очищению ран, регенерации тканей и эпителизации.

Показания к применению:

Наружно: фурункулы, карбункулы, трофические язвы, гнойные раны, мастит, раны мягких тканей, ожоги, обморожения.

В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Наружно: для смачивания салфеток или непосредственного нанесения на раневую поверхность в достаточном количестве 2-3 раза в день. Курс лечения от 5 до 18 дней в зависимости от тяжести заболевания.

Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Побочное действие:

Аллергические реакции. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка:

О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

Не изучалось.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:

Не изучалось.

Форма выпуска:

Жидкость для наружного применения.

По 50 и 100 г во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной типа ФВ укупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми.

По 50 и 100 г во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной типа ФВ укупоренные крышками навинчиваемыми типа 1220-241-241-132-0.

По 50 г или 100 г во флаконы из полиэтилентерефталата для лекарственных средств со средствами укупорочными.

На флаконы наклеивают этикетки из бумаги этикеточной, или писчей, или самоклеящиеся. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

20, 40, 50, 60, 80, 100, 120 флаконов по 50 г; 20, 40, 50, 60, флаконов по 100 г вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона (Для стационаров).

Срок годности

5 лет. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения:

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска:

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения:

АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»

Россия, 665462, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, северо-западная часть города, с северо-восточной стороны, в 115 м от Прибайкальской автодороги.

Производитель/организация принимающая претензии:

ООО «Аромасинтез», Россия

г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 39


тел.: +7(4842) 47-72-62

Адрес для обращений и претензий

248010, г. Калуга, п/о 10, а/я 810.

Генеральный директор

АО «Усолье-Сибирский Химфармзавод»



С.В. Тюстин

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА

ВИНИЛИН

Регистрационный номер: ЛП-003251

Торговое наименование препарата: Винилин

Международное непатентованное или группировочное наименование: поливинокс

Лекарственная форма: жидкость для наружного применения.

Состав:

действующее вещество: поливинокс — 50 г/100 г.

Описание:

Густая, вязкая жидкость светло-желтого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.

Код АТХ: D08AX.

Фармакологические свойства:

Обладает антисептическим действием, способствует очищению ран, регенерации тканей и эпителизации.

Показания к применению:

Наружно: фурункулы, карбункулы, трофические язвы, гнойные раны, мастит, раны мягких тканей, ожоги, обморожения.

В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Наружно: для смачивания салфеток или непосредственного нанесения на раневую поверхность в достаточном количестве 2-3 раза в день. Курс лечения от 5 до 18 дней в зависимости от тяжести заболевания.

Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Побочное действие:

Аллергические реакции. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка:

О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

Не изучалось.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:

Не изучалось.

Форма выпуска:

Жидкость для наружного применения.

По 50 и 100 г во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной типа ФВ укупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми.

По 50 и 100 г во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной типа ФВ укупоренные крышками навинчиваемыми типа 1220-241-241-132-0.

По 50 г или 100 г во флаконы из полиэтилентерефталата для лекарственных средств со средствами укупорочными.

На флаконы наклеивают этикетки из бумаги этикеточной, или писчей, или самоклеящиеся. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

20, 40, 50, 60, 80, 100, 120 флаконов по 50 г; 20, 40, 50, 60, флаконов по 100 г вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона (Для стационаров).

Срок годности

5 лет. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения:

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска:

Отпускают без рецепта.


Производитель/организация принимающая претензии:

АО «Усолъе-Сибирский Химфармзавод»

Россия, 665462, Иркутская область, г. Усолъе-Сибирское, северо-западная часть города, с северо-восточной стороны, в 115 м от Прибайкальской автодороги, телефон: +7 (39543) 58910, факс +7 (39543) 58908

Генеральный директор

АО «Усолъе-Сибирский Химфармзавод»



С.В. Тюстин