

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Винилин

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Винилин.

Международное непатентованное или группировочное наименование: поливинокс.

Лекарственная форма: жидкость для приема внутрь и наружного применения.

Состав

действующее вещество:

поливинокс (винилин) – 50 г или 100 г.

Описание: густая вязкая жидкость светло-желтого цвета, специфического запаха. На воздухе не густеет и не высыхает.

Фармакотерапевтическая группа: антисептики и дезинфицирующие средства; другие антисептики и дезинфицирующие средства.

Код АТХ: D08AX.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Оказывает антисептическое действие, способствует очищению ран, регенерации тканей и эпителизации.

При приеме внутрь действует как обволакивающее, противовоспалительное и бактериостатическое средство.

Фармакокинетика

Нет сведений.

Показания к применению

Наружно: фурункулез, карбункулы, трофические язвы, гнойные раны, мастит, раны мягких тканей, ожоги, обморожения.

Внутрь: в комплексном лечении эрозивно-язвенных заболеваний желудка и 12-перстной кишки, обострение хронических гастритов с повышенной секреторной функцией желудка.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к поливиноксу, заболевания печени, желчного пузыря и почек, детский возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания.

С осторожностью

Данные отсутствуют.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Наружно: для смачивания салфеток и непосредственного нанесения на раневую поверхность в достаточном количестве 2-3 раза в день. Курс лечения от 5 до 18 дней в зависимости от тяжести заболевания.

Внутрь: 1 раз в день через 5-6 ч после последнего приема пищи (рекомендуется легкий ужин в 18 ч и прием препарата в 23-24 ч); при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки – 1 чайная ложка в первый день, в последующие дни – по 1 десертной ложке; курс – 16-20 дней; при гастритах с повышенной секреторной функцией и выраженной изжоге – в первый день – 1 чайную ложку, далее – по 1 десертной ложке через день, курс – в течение 10-12 дней.

Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось.

Особые указания

Нет сведений.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не изучалось.

Форма выпуска

Жидкость для приема внутрь и наружного применения.

По 50 и 100 г препарата во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, закупоренные пробками полимерными, или пробками полиэтиленовыми, или пробками «Топаз» и крышками полимерными навинчиваемыми или типа «Топаз», или по 100 г во

флаконы, укупоренные пробками с уплотнительным элементом или пробками «заглушки» и крышками навинчиваемыми, или крышками «Топаз», или колпачками алюминиевыми, или по 50 г и 100 г во флаконы полимерные, укупоренные пробками полимерными или пробками с уплотнительными элементами и крышками полимерными.

По 50, 100 г в тубы ламинатные с бушонами или в тубы алюминиевые с бушонами.

Каждый флакон, тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары или из картона макулатурного.

Допускается укладка флаконов, туб в групповую упаковку (коробку картонную) с равным количеством инструкций по применению.

Допускается наносить текст инструкции на пачку.

На флаконы, тубы, пачки наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей или самоклеящуюся этикетку.

Допускается нанесение маркировки непосредственно на тубу.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «Женел РД», Россия, 249717, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70.

Производитель

АО «Самарамедпром», Россия, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, зд. 99Б.

Организация, принимающая претензии потребителя

АО «Самарамедпром», 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, помещ. 16Н/38.

Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.