ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ
ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
КАЛЬЦИНОВА
KALCINOVA®

Регистрационный номер:
Торговое (патентованное) название: Кальцинова.
Международное (непатентованное) или группировочное название: поливитамин + мультиминерал &.
Лекарственная форма: таблетки фруктовые.

Состав
1 таблетка содержит:
Активные вещества:

Пиридоксина гидрохлорид (витамин B_6)	0,4 мг
Ретинола пальмитат, порошок 500 МЕ/г (витамин А)(что соответствует 1000 МЕ)	2 мг
Колекальциферол 100 МЕ/г (витамин D_3) (что соответствует 100 МЕ)	1 мг
Аскорбиновая кислота (витамин С)	15 мг
Кальция гидрофосфата дигидрат	430,4 мг

(что соответствует содержанию кальция -100 мг и фосфора -77 мг в одной таблетке).
Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, повидон, лимонная кислота, безводная, полисорбат 80, магния стеарат.
1 таблетка светло-зеленого цвета (киви) дополнительно содержит: краситель зеленый [краситель хинолиновый желтый (Е104), индигокармин (Е132)], ароматизатор киви, сахароза.
1 таблетка светло-голубого цвета (черничные) дополнительно содержит: индигокармин (Е132), ароматизатор черничный, сахароза.
1 таблетка светло-желтого цвета (ананасовые) дополнительно содержит: краситель хинолиновый желтый 06121 (Е104), ароматизатор ананасовый, сахароза.
1 таблетка розового цвета (малиновые) дополнительно содержит: краситель красный очаровательный (Е129), ароматизатор малиновый, сахароза.

Описание
Круглые таблетки с незначительной мраморностью на поверхности.
Таблетки: розового цвета (малиновые); светло-желтого цвета (ананасовые); светло-голубого цвета (черничные); светло-зеленого цвета (киви).

Фармакотерапевтическая группа: поливитаминное средство + минералы
Код АТХ: A11AA04

Фармакологические свойства
Комбинированный препарат, содержащий комплекс витаминов и минералов, являющихся важными факторами метаболических процессов.
Кальций участвует в формировании костной ткани, свертывании крови, передаче нервных импульсов, сокращении скелетных и гладких мышц, нормальной работе сердца.
Фосфор наряду с кальцием участвует в формировании костей и зубов, а также участвует в процессах энергетического обмена.
Для правильной минерализации костей и зубов кроме кальция и фосфора, являющихся строительным материалом, необходимо употреблять витамины, особенно витамин D_3, способствующий абсорбции кальция и фосфора в органах пищеварения и их правильному распределению в костной и зубной тканях.

Витамин А участвует в синтезе различных веществ (белков, липидов, мукополисахаридов) и обеспечивает нормальную функцию кожи, слизистых оболочек, а также органа зрения.
Витамин В6 способствует поддержанию структуры и функции костей, зубов, десен; оказывает влияние на эритропоэз, способствует нормальному функционированию нервной системы.
Витамин С участвует в окислении ряда биологически активных веществ, регуляции обмена в соединительной ткани, углеводного обмена, свертываемости крови и регенерации тканей, стимулирует образование стероидных гормонов, нормализует проницаемость капилляров. Витамин С повышает устойчивость организма к инфекциям, снижает воспалительные реакции.

Показания к применению
Таблетки Кальцинова рекомендуются:
• для детей в период интенсивного роста и развития;
• для детей с непереносимостью к молоку и молочным продуктам;
• для укрепления и защиты костей и зубов у детей

Противопоказания
- Повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- Повышенное содержание солей кальция в крови и моче;
- Гипервитаминоз;
- Тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина (КК) менее 30 мл/мин);
- Детский возраст до 3-х лет.

С осторожностью: сахарный диабет.

Способ применения и дозы
Внутрь, таблетки держать во рту до полного растворения либо разжевывать.
Детям от 3 до 4 лет принимать 2 - 3 таблетки в сутки, детям от 4 лет и старше - по 4-5 таблеток в сутки.

Побочные действия
Возможны аллергические реакции, диарея и боль в животе. В этом случае необходимо прервать лечение препаратом Кальцинова и посоветоваться с лечащим врачом.

Передозировка
Не принимать больше рекомендуемых доз.
Длительный прием очень высоких доз Кальциновы может привести к гипервитаминозу витаминов А и D, повышению содержания кальция в крови и моче.
Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Таблетки Кальцинова нельзя принимать одновременно с препаратами тетрациклинового ряда и натрия фторидом, так как кальций снижает абсорбцию этих препаратов. Если необходимо одновременное лечение этими препаратами и таблетками Кальцинова, временной промежуток между приемами должен быть не менее 3 часов.
Пиридоксин угнетает активность леводопы.

Особые указания
Больным сахарным диабетом не рекомендуется принимать таблетки Кальциновы, т.к. они содержат сахар.

Влияние на способность к управлению автомобилем и другими механическими средствами: не известно отрицательного влияния на способность управления автомобилем и работе с другими механизмами.

Форма выпуска
Таблетки фруктовые.
По 9 таблеток в блистер. По 3 блистера в пачку картонную вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
2 года.
Не применять препарат после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Производитель: КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения

По всем вопросам обращаться по адресу Представительства в РФ:
123022, Москва, ул.2-я Звенигородская, д.13 , стр.41
Тел. (495) 739-66-00, факс (495) 739-66-01

И.О. директора ИДКЭЛС А.Н. Васильев

Представитель фирмы О.А. Цибульская

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto 9452