ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
ТЕРАВИТ АНТИОКСИДАНТ

Регистрационный номер:

Торговое название препарата. Теравит Антиоксидант.

Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Состав:

В одной таблетке содержится:

Действующие вещества:

Бета-каротен (Витамин А)	5000 МЕ
Аскорбиновая кислота (Витамин С)	60 мг
Альфа-токоферола ацетат (Витамин Е)	30 МЕ
Медь (в виде меди оксида)	2 мг
Цинк (в виде цинка оксида)	40 мг
Селен (в виде хелата аминокислоты)	40 мкг

Вспомогательные вещества:
кальция гидрофосфат, желатин, стеариновая кислота, сахар (сахароза), кроскармеллоза натрия, магния стеарат, крахмал кукурузный, кремния диоксид коллоидный, поливинилпирролидон (повидон), триацетин, смесь токоферолов, натрия аскорбат, кальция фосфат, аскорбилпальмитат, магния силикат.
Оболочка:
микрокристаллическая целлюлоза, гипромеллоза, титана диоксид, краситель солнечный закат желтый, масло минеральное.

Описание
Таблетки овальной формы, покрытые оболочкой светло-оранжевого цвета.

Фармакотерапевтическая группа. Поливитамин + мультиминерал.

Код АТХ. [A11AA04].

Фармакологическое действие
Фармакологическое действие препарата определяется свойствами входящих в его состав ингредиентов.
Содержит комбинацию витаминов А, Е и С и микроэлементов, оказывающих влияние на процессы окисления в организме на уровне клетки.

Показания к применению
Профилактика витаминной недостаточности и дефицита минеральных веществ у взрослых (при повышенных физических нагрузках, в комплексной терапии в период выздоровления после перенесенных заболеваний).

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Заболевания центральной нервной системы, сопровождающиеся повышенным внутричерепным давлением; тяжелые нарушения функций печени, острый период инфаркта миокарда, период беременности и грудного вскармливания, тяжелая почечная недостаточность (КК менее 30 мл/мин.), детский возраст до 18 лет.
С осторожностью: при назначении больным с острой и хронической почечной недостаточностью, декомпенсированными пороками сердца, кардиосклерозом, повышенной свертываемостью крови, тромбофлебитами, склонностью к тромбозам, сахарным диабетом.

Способ применения и дозы
Перед началом курса проконсультируйтесь с врачом.
По 1 таблетке в сутки после еды. Курс приема препарата 30 дней. Повторные курсы через 1-3 месяца по рекомендации врача.

Побочное действие
Возможны аллергические реакции к компонентам препарата, диарея, боль в животе.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Бета- каротен является синергистом витамина Е.
Витамина С (аскорбиновая кислота) устраняет тормозящее влияние нестероидных противовоспалительных препаратов и глюкокортикостероидных препаратов на синтез коллагена, фагоцитарную активность нейтрофилов.
Тетрациклины и салицилаты ускоряют выведение аскорбиновой кислоты почками, поэтому на фоне их применения целесообразно увеличение дозы.
Аскорбиновая кислота ускоряет метаболические процессы и экскрецию многих лекарственных средств, поэтому целесообразно увеличение их дозировок на фоне систематического применения.
Совместное применение витамина Е и селена усиливает антиоксидантный эффект.

Особые указания
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Во время приема препарата не рекомендуется прием других лекарственных средств, содержащих витамины, во избежании передозировки.
Не следует назначать больше одной таблетки в день больным с повышенной свертываемостью крови, тромбофлебитами, склонностью к тромбозам. При длительном использовании препарата больными сахарным диабетом необходим регулярный контроль уровня сахара в крови и моче.

Форма выпуска
Таблетки покрытые пленочной оболочкой.

По 30 таблеток во флаконе из полиэтилена высокой плотности с завинчивающейся крышкой из полипропилена, опечатанной полимерной пленкой. Горлышко флакона опечатано защитной упаковкой. Флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в картонную пачку.

Условия хранения
При температуре от 15 °С до 30 °С в сухом месте.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска
Без рецепта.

Производитель. Сагмел, Инк., Чикаго, США.
1580 Саус Милуоки Авеню, 415, Либертвилл, Иллинойс 60048, США.
Представительство в России:
129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 7
Тел.: (495) 937-40-73, 937-40-80 факс (495) 937-40-83

Зам. Управляющего Представительства
по медицинским вопросам И.В. Нефедова

И.о. директора ИДКЭЛС А. Н. Васильев