ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

АНТИОКСИКАПС С ЙОДОМ

Регистрационный номер:
Торговое название препарата: АНТИОКСИКАПС С ЙОДОМ
Лекарственная форма: капсулы
Состав

1 капсула содержит:
Активные компоненты:
бетакаротен (провитамин А) – 6 мг,
(в виде 30% масляной суспензии) – 20 мг
α - токоферола ацетата (витамина Е) – 15 мг,
аскорбиновая кислота (витамин С) – 75 мг,
йод – 0,1 мг
(в виде калия йодида) – 0,131 мг
Вспомогательные вещества: масло подсолнечное рафинированное; воск пчелиный, лецитин очищенный.

Состав оболочки желатиновых капсул: желатин фармацевтический, глицерол, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, вода очищенная, титана диоксид, краситель Красный очаровательный Е 129.

Описание

Капсулы мягкие желатиновые продолговатой формы со швом, красного цвета.

Содержимое капсул – маслянистая суспензия красного цвета. Не должно быть прогорклого запаха.

Фармакотерапевтическая группа: Поливитамины с микроэлементами.
Код АТХ [А 11 ВА].

Фармакологическое действие

Фармакологическая активность Антиоксикапса с йодом обусловлена комплексным действием содержащихся в нем витаминов: кислоты аскорбиновой, α – токоферола ацетата, бета-каротина и йода.

Кислота аскорбиновая участвует в регулировании окислительно-восстановительных процессов в организме, активирует углеводно-белковый обмен, увеличивает метаболизм холестерина, повышает свертываемость крови, усиливает регенерацию тканей, синтез стероидных гормонов, коллагена и проколлагена. Она повышает адаптационные возможности организма и усиливает его сопротивляемость к инфекциям.

Альфа-токоферола ацетат ингибирует окисление жиров в организме и образование из них токсических перекисей, стабилизируя прочность связей в ненасыщенных жирных кислотах. Он нормализует структуру и функцию мембран эритроцитов, эндотелиоцитов, энтероцитов и др. Токоферол участвует в биосинтезе коллагена, гема и белков, активирует пролиферацию клеток, функцию тканевого дыхания и других важнейших процессов клеточного метаболизма. Он стимулирует образование гонадотропинов, сперматогенез, развитие оплодотворенного яйца, плаценты.

Бета-каротин обладает антиоксидантным, иммуномодулирующим и противовоспалительным действием за счет его способности связывать активный кислород и, таким образом, защищать клеточные структуры от разрушения свободными радикалами, образующимися в

большом количестве при воздействии неблагоприятных факторов внешней среды или при развитии патологических процессов в организме.

Йод, активно влияя на обмен веществ и усиливая процессы диссимиляции, необходим для эндогенного синтеза гормонов щитовидной железы, а также для обеспечения нормального морфофункционального состояния щитовидной железы. При поступлении йодидов в клетки эпителия фолликула щитовидной железы йодид-ионы под влиянием фермента йодидпероксидазы окисляются с образованием элементарного йода, который включается в молекулу тирозина. При этом одна часть радикалов тирозина в тиреоглобулине йодируется с образованием тиронинов, основными из которых являются тироксин (T_4) и трийодтиронин (T_3). Тиронины образуют комплекс с белком тиреоглобулином, который депонируется в коллоиде фолликула щитовидной железы.

Показания к применению

Профилактика состояний, связанных с повышенной потребностью в витаминах и йоде: при повышенных физических и умственных нагрузках, в период восстановления после продолжительных и/или тяжело протекающих заболеваний, при астенических состояниях различной этиологии.

Противопоказания

- гипервитаминоз А и Е;
- беременность;
- детский возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к его компонентам.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь после еды, запивая большим количеством жидкости.

С профилактической целью препарат рекомендуется назначать взрослым по 1 капсуле 1 раз в сутки. Продолжительность курса по рекомендации врача.

Побочное действие

Аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Глюкокортикостероидные препараты, антибиотики тетрациклиновой группы, а также этанол и этанолсодержащие препараты при совместном присутствии снижают терапевтический эффект провитамина А.

Токоферол может повышать эффективность противосудорожных средств у больных эпилепсией, у которых обнаружено повышенное содержание в крови продуктов перекисного окисления липидов.

Всасывание аскорбиновой кислоты уменьшается при одновременном применении оральных контрацептивов и, вместе с тем, витамин С повышает всасывание пенициллина, железа, увеличивает риск возникновения кристаллурии при лечении салицилатами.

Особые указания

Не рекомендуется принимать одновременно другие поливитаминные комплексы во избежание передозировки.

Форма выпуска

Капсулы.

По 10 капсул в блистер, по 2 блистера вместе с инструкцией по применению в пачке из картона коробочного.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 15 °С до 25 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

2 года. Не использовать после истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Производитель

УП «Минскинтеркапс», Республика Беларусь,
220075, г. Минск, а/я 112, ул. Инженерная, 26

И.о. директора ИДКЭЛС С.В. Буданов

Директор
УП «Минскинтеркапс» А.В. Бондарев