ЛП-№(013739)-(РГ-RU) от 02.03.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.02.2026 № 3598
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

РЕВИТ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Ревит

Международное непатентованное или группировочное наименование: Поливитамины

Лекарственная форма: драже

Состав

Активные вещества:

Ретинола пальмитат (витамин А - пальмитат) - 0,00138 г (2500 МЕ)

Тиамина гидрохлорид - 0,001 г

Рибофлавин - 0,001 г

Аскорбиновая кислота – 0,035 г

Вспомогательные вещества: мука пшеничная, патока крахмальная, сахароза (сахар), мяты перечной листьев масло (масло эфирное мятное ректификованное), воск пчелиный, подсолнечника масло (масло подсолнечное), тальк.

Описание: драже желто-оранжевого цвета, правильной шарообразной формы с гладкой поверхностью.

Фармакотерапевтическая группа: витамины; другие комбинированные витаминные препараты; комбинации витаминов.

Код АТХ: A11JA.

Фармакологическое действие

Фармакологический эффект драже «Ревит» обусловлен входящими в его состав витаминами.

Ретинола пальмитат (витамин А) преимущественно обеспечивает нормализацию процессов белкового и углеводного обменов.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.02.2026 № 3598
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Тиамина гидрохлорид (витамин B_1) обеспечивает нормальную функциональную деятельность нервной, сердечно - сосудистой систем, пищеварительного тракта.

Рибофлавин (витамин B_2) является важным компонентом в белковом, жировом и углеводном обмене, принимает участие в поддержке нормальной зрительной функции глаза.

Аскорбиновая кислота (витамин С) участвует в окислительно-восстановительных процессах, обмене углеводов, свертывании крови, регенерации тканей.

Показания к применению

Препарат Ревит предназначен для профилактики дефицита витаминов, входящих в его состав, у взрослых и детей с 3 лет.

Противопоказания

Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата; дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, детский возраст до 3 лет.

С осторожностью

В состав препарата входит сахароза (1 драже содержит 0,034 ХЕ сахарозы), что следует учитывать больным сахарным диабетом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Возможно применение препарата по назначению врача.

Способ применения и дозы

Внутрь, через 10–15 минут после еды.

Взрослым – по 1 драже 3 раза в день ежедневно в течение 1–2 месяцев.

Детям от 3 до 7 лет – по 1–2 драже в день, от 7 до 15 лет – по 2–3 драже в день ежедневно в течение 1–2 месяцев.

Побочное действие

Для описания частоты нежелательных реакций в данном разделе используется следующая классификация MedDRA:

очень часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100, но < 1/10); нечасто (≥ 1/1000, но < 1/100);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.02.2026 № 3598
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

редко (≥ 1/10000, но < 1/1000); очень редко (< 1/10000); частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Нарушения со стороны иммунной системы

Частота неизвестна - возможны аллергические реакции.

Передозировка

Жирорастворимые витамины могут накапливаться в тканях. При передозировке они более токсичны, чем водорастворимые.

Симптомы

Симптомы острой передозировки витамина А (развиваются через 6 ч после приема в дозе от 300 000 ЕД до 1 млн ЕД (120–400 драже) однократно): сонливость, вялость, диплопия, головокружение, сильная головная боль, тошнота, тяжелая рвота, диарея, раздражительность, остеопороз, кровотечение из десен, сухость и изъязвление слизистой оболочки полости рта, шелушение губ, кожи (особенно ладоней), возбуждение, спутанность сознания. Клиника обратима.

Лечение

Отмена препарата; симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не изучалось.

Особые указания

Не рекомендуется одновременный прием других поливитаминных комплексов во избежание передозировки.

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина.

Вспомогательные вещества

Препарат содержит сахарозу. Пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует принимать этот препарат.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.02.2026 № 3598
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Применение препарата не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Форма выпуска

По 100 штук в банки из полиэтилена низкого давления типа БП-60 в комплекте с навинчиваемыми крышками из полиэтилена низкого давления.

По 10 штук в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

Каждую банку или 3, или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

1 год 6 месяцев.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Производитель /

Предприятие, принимающее претензии

АО "Марбиофарм", 424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д. 121.

Тел.: (8362) 42-03-12, факс: (8362) 45-00-00.