ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

«ГЛУТАМЕВИТ»

Регистрационный номер

Торговое название препарата. Глутамевит

Лекарственная форма. Таблетки покрытые оболочкой

Описание: таблетки белого цвета, с характерным запахом. На поперечном разрезе видны два слоя; внутренний - неоднородный по окраске.

Состав.

Ретинола ацетата (витамин А)	0,001135 г (3300 МЕ)
Тиамина хлорида (витамин B_1)	0,002 г
или тиамина бромида (витамин B_1)	0,00258 г
Рибофлавина (витамин B_2)	0,002 г
Пиридоксина гидрохлорида (витамин B_6)	0,003 г
Кислоты аскорбиновой (витамин С)	0,1 г
α – Токоферола ацетата (витамин Е)	0,02 г
Никотинамида	0,02 г
Кислоты фолиевой	0,00005 г
Рутина	0,02 г
Кальция пантотената	0,01 г
Кислоты глутаминовой	0,25 г
Железа(II) сернокислого 7-водного	0,01 г
Меди(II) сернокислой 5-водной	0,002 г
Калия сернокислого	0,0025 г

Кальция фосфата дигидрата 0,04 г

Вспомогательные вещества: крахмал, кислота лимонная, поливинилпирролидон, метилцеллюлоза, кальция стеарат, тальк, сахар, титана двуокись, аэросил, магния карбонат основной, мука, воск пчелиный, масло вазелиновое.

Фармакотерапевтическая группа: поливитаминный препарат.

КОД АТХ – [A11AA03]

Фармакологические свойства

Фармакологическое действие препарата обусловлено свойствами витаминов, минералов и микроэлементов, входящих в его состав. Препарат стимулирует окислительно-восстановительные процессы в организме, повышает утилизацию тканями кислорода, улучшает физическую работоспособность.

Показания к применению

Назначают в качестве лечебно-профилактического средства при повышенных физических нагрузках, для ускорения процессов адаптации к экстремальным факторам внешней среды.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, беременность.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь, во время, или после завтрака и обеда (2 раза в день). Разовая доза 1-3 таблетки, суточная 2-6 таблетки. Курс 2-4 недели. При необходимости повторяют курсы с промежутками 1-3 мес.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, диспепсические расстройства.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Аскорбиновая кислота повышает всасывание препаратов группы пенициллина, же[illegible]еза.

Форма выпуска

По 30 или 60 таблеток в банки из стекломассы оранжевого цвета или из полимерных материалов. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

2 года.

Не использовать позже срока указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Отпускается без рецепта врача.

Производитель: ОАО «Марбиофарм», 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 121.

Представитель фирмы Г.У. Умерова

Директор ИДКЭЛС В.В. Чельцов