ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

КОМПЛИВИТ® Актив жевательный

Регистрационный номер:

Торговое название: КОМПЛИВИТ® Актив жевательный

Лекарственная форма: таблетки жевательные для детей (банановые, вишневые, крем-брюле, молочно-шоколадные).

Состав

Витамина А (ретинола ацетата) в виде мелкогранулированного порошка, содержащего витамин А ацетат, бутилгидрокситолуол (Е 321), желатин, сахарозу, крахмал кукурузный	- 0,35 мг (1017 МЕ)
Витамина Е (α-токоферола ацетата) в виде порошка, содержащего dl-альфа токоферол, кремния диоксид, желатин гидролизованный	- 5 мг
Витамина B_1 (тиамина гидрохлорида)	- 0,6 мг
Витамина B_2 (рибофлавина)	- 0,7 мг
Витамина B_6 (пиридоксина гидрохлорида)	- 0,8 мг
Витамина С (аскорбиновой кислоты)	- 30 мг
Никотинамида	- 7,5 мг
Фолиевой кислоты	- 100 мкг
Витамина D_3 (колекальциферола) (в пересчете на 100 % колекальциферол) в виде гранулята, содержащего: колекальциферол, бутилгидрокситолуол (Е 321), сахарозу, желатин, натрия алюмосиликат, триглицериды средней цепи, крахмал модифицированный, воду	- 1,25 мкг (50 МЕ)
Кальция пантотената	- 2 мг
Витамина B_{12} (цианокобаламина)	- 1 мкг
Магния (в виде магния оксида)	- 25 мг
Кальция (в виде кальция гидрофосфата дигидрата)	- 65 мг
Йода (в виде натрия йодида)	- 50 мкг

Вспомогательные вещества: сахароза (сахар), кросповидон (коллидон CL-SF), крахмал картофельный, крахмал модифицированный, декстроза (глюкоза), магния стеарат, тальк, ароматизатор (банановый, вишневый, крем-брюле, молоко сгущенное, шоколад), аспартам (Е 951).

Описание: таблетки круглые двояковыпуклые. На поверхности таблетки выдавлено изображение «веселой рожицы».

Банановые, вишневые, крем-брюле: от светло-кремового до темно-кремового цвета с оранжевым оттенком с вкраплениями, с запахом и сладковато-горьковатым вкусом банана, вишни или крем-брюле, соответственно;

Молочно-шоколадные: от светло-бежевого до темно-бежевого цвета с серым оттенком с вкраплениями, с запахом и сладковато-горьковатым вкусом шоколада.

Фармакотерапевтическая группа: поливитаминное средство + минералы.

Код АТХ: A11AA04.

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат - сбалансирован с учетом суточной потребности в витаминах и минералах у детей. Совместимость компонентов обеспечена специальной технологией производства витаминно-минеральных комплексов.

Действие препарата обусловлено эффектами входящих в его состав компонентов:

Ретинол (витамин А) – обеспечивает функциональную деятельность органов зрения. Необходим для здорового состояния кожи, зубов, волос.

α-Токоферола ацетат (витамин Е) – обладает антиоксидантными свойствами, предупреждает повреждение клеток; оказывает положительное влияние на функции нервной и мышечной ткани.

Колекальциферол (витамин D_3) – регулирует обмен кальция и фосфора в организме, способствуя процессу остеогенеза. При недостатке нарушается кальциевый гомеостаз и фосфорный обмен, снижается сила и тонус мышц. Необходим для нормального формирования костей и зубов.

Тиамин (витамин B_1) – участвует в углеводном обмене, нормализует работу нервной и сердечно-сосудистой систем.

Рибофлавин (витамин B_2) – важнейший катализатор процессов клеточного дыхания и зрительного восприятия. Участвует в углеводном, белковом и жировом обменах, а также в синтезе гемоглобина и эритропоэтина.

Пиридоксин (витамин B_6) – принимает участие в белковом обмене и синтезе нейромедиаторов.

Цианокобаламин (витамин B_{12}) – участвует в синтезе нуклеотидов, является важным фактором нормального роста, кроветворения и развития эпителиальных клеток; необходим для метаболизма фолиевой кислоты и синтеза миелина.

Никотинамид (витамин РР) – участвует в процессах тканевого дыхания, жирового и углеводного обмена.

Фолиевая кислота - принимает участие в синтезе аминокислот, нуклеотидов, нуклеиновых кислот; необходима для нормального эритропоэза.

Кальция пантотенат - играет важную роль в процессах ацетилирования и окисления; способствует построению, регенерации эпителия и эндотелия.

Аскорбиновая кислота (витамин С) – обеспечивает синтез коллагена; участвует в формировании и поддержании структуры и функции хрящей, костей, зубов; участвует в метаболизме железа, созревании эритроцитов. Витамин С повышает устойчивость организма к инфекциям, снижает воспалительные реакции.

Магний – играет важную роль в регуляции нервно-мышечной активности сердца, участвует во многих ферментативных реакциях, а также в синтезе белка.

Кальций - необходим для формирования костей, проведения нервных импульсов, сокращения скелетных и гладких мышц, свертывания крови.

Йод – необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, регулирующих физическое и психическое развитие.

Показания к применению

- профилактика дефицита витаминов и минеральных веществ у детей от 3 до 10 лет;
- для повышения сопротивляемости организма у детей в возрасте от 3 до 10 лет после перенесенных инфекционных заболеваний, при физических и умственных нагрузках, при регулярных спортивных занятиях;
- при недостаточном и несбалансированном питании у детей в возрасте от 3 до 10 лет.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Детский возраст до 3 лет. Гипервитаминоз А. Фенилкетонурия .

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь после еды. Таблетку следует разжевать и запить небольшим количеством воды.

Детям от 3 до 6 лет по 1 таблетке 1 раз в день, от 6 до 10 лет – по 1 таблетке 2 раза в день.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

При многократном превышении терапевтической дозы возможно возникновение рвоты, диареи, мышечной слабости, обусловленных гипервитаминозом витаминов А и D_3.

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу.

Лечение: временное прекращение приема препарата, промывание желудка, прием активированного угля внутрь, симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими лекарствами

Не рекомендуется одновременное применение других поливитаминных комплексов во избежание передозировки.

Препарат содержит кальций, поэтому задерживает всасывание в кишечнике антибиотиков из группы тетрациклинов и фторхинолонов.

Особые указания

Во избежание передозировки следует строго соблюдать режим дозирования препарата.

При возникновении аллергических реакций на компоненты препарата следует отменить препарат.

Возможно окрашивание мочи в ярко-желтый цвет, что совершенно безвредно и объясняется наличием в составе препарата рибофлавина.

Форма выпуска

Таблетки жевательные для детей.

По 30, 60, 90, 100 или 120 таблеток в банках полимерных. На банке, содержащей 30 или 60 таблеток, наклеена самоклеящаяся этикетка. На банке, содержащей 90, 100 и 120 таблеток, наклеена самоклеящаяся этикетка или многостраничная самоклеящаяся этикетка. Каждая банка обтянута термоусадочной трубкой. Каждая банка помещена в пачку из картона вместе с инструкцией по применению или банки по 90, 100 или 120 таблеток с многостраничной этикеткой помещены в ящик из гофрокартона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек: без рецепта.

Производитель/предприятие, принимающее претензии потребителей:
ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»
450077, Россия, г. Уфа, ул. Худайбердина, 28, телефон/факс (347) 272 92 85.

Представитель
ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»



