МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-006959/09 - 270618
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Компливит® Актив жевательный

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Компливит® Актив жевательный

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Поливитамины+Минералы

Лекарственная форма: таблетки жевательные для детей [банановые, вишневые].

Состав на одну таблетку

Действующие вещества

Витамин А (ретинола ацетат) в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 1017 МЕ, сахарозу - 0,0712 мг, крахмал модифицированный - 0,3661 мг, натрий-алюминия силикат - 0,0061 мг, бутил-гидрокситолуол - 0,00285 мг, желатин - 0,5085 мг, воду очищенную до 2,03 мг	- 0,35 мг (1017 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)
Витамин Е (α-токоферола ацетат) в виде порошка, содержащего DL-α-токоферола ацетат- 5 мг, желатин - 1,7 мг, сахарозу - 0,47 мг, кукурузный крахмал - 2 мг, натрия-алюминия силикат (Е 554) - 0,13 мг, воду до 10,0 мг	- 5 мг (в пересчете на 100 % вещество)
Витамин В1 (тиамина гидрохлорид)	- 0,6 мг
Витамин В2 (рибофлавин)	- 0,7 мг
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид)	- 0,8 мг
Витамин С (аскорбиновая кислота)	- 30 мг
Никотинамид	- 7,5 мг
Фолиевая кислота	- 100 мкг
Витамин D3 (колекальциферол) в виде гранулята, содержащего колекальциферол - 1,25 мкг (0,27 %), D,L-альфа-токоферол - 0,13 мкг	- 1,25 мкг (50 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)

(0,0275 %), триглицериды среднецепочечные - 49,54 мкг (10,7 %), сахарозу - 166,67 мкг (36 %), камедь акации - 101,85 мкг (22 %), кукурузный крахмал - 125,00 мкг (27 %), кальция фосфат (Е 341) - 2,31 мкг (0,5 %), воду до 462,96 мкг (до 100 %)

Кальция пантотенат - 2 мг

Витамин В12 (цианокобаламин) - 1 мкг

Магний (в виде магния оксида) - 25 мг

Кальций (в виде кальция гидрофосфата дигидрата) - 65 мг

Йод (в виде натрия йодида) - 50 мкг

Вспомогательные вещества: кросповидон - 30 мг, крахмал картофельный - 6,67 мг, крахмал модифицированный - 4 мг, декстроза (глюкоза) - 200 мг, колликоат® Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,125 мг, магния стеарат - 10 мг, тальк - 10 мг, ароматизатор банановый или ароматизатор вишневый - 4 мг, аспартам (Е 951) - 0,24 мг, сахароза (сахар белый) - 360,40604 мг.

Описание: таблетки круглые двояковыпуклые, от светло-кремового до темно-кремового цвета, допускается оранжевый оттенок, с вкраплениями разного цвета, с запахом банана или вишни, соответственно.

На поверхности таблеток выдавлено изображение «веселой рожицы».

Фармакотерапевтическая группа: поливитаминное средство+минералы

Код АТХ: A11AA04

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат - сбалансирован с учетом суточной потребности в витаминах и минералах у детей. Совместимость компонентов обеспечена специальной технологией производства витаминно-минеральных комплексов.

Действие препарата обусловлено эффектами входящих в его состав компонентов:

Ретинол (витамин А) - обеспечивает функциональную деятельность органов зрения. Необходим для здорового состояния кожи, зубов, волос.

α-Токоферола ацетат (витамин Е) - обладает антиоксидантными свойствами, предупреждает повреждение клеток; оказывает положительное влияние на функции нервной и мышечной ткани.

Колекальциферол (витамин D3) - регулирует обмен кальция и фосфора в организме, способствуя процессу остеогенеза. При недостатке нарушается кальциевый гомеостаз и фосфорный обмен, снижается сила и тонус мышц. Необходим для нормального формирования костей и зубов.

Тиамин (витамин B1) - участвует в углеводном обмене, нормализует работу нервной и сердечно-сосудистой систем.

Рибофлавин (витамин B2) - важнейший катализатор процессов клеточного дыхания и зрительного восприятия. Участвует в углеводном, белковом и жировом обменах, а также в синтезе гемоглобина и эритропоэтина.

Пиридоксина (витамин B6) - принимает участие в белковом обмене и синтезе нейромедиаторов.

Цианокобаламин (витамин B12) - участвует в синтезе нуклеотидов, является важным фактором нормального роста, кроветворения и развития эпителиальных клеток; необходим для метаболизма фолиевой кислоты и синтеза миелина.

Никотинамид (витамин PP) - участвует в процессах тканевого дыхания, жирового и углеводного обмена.

Фолиевая кислота - принимает участие в синтезе аминокислот, нуклеотидов, нуклеиновых кислот; необходима для нормального эритропоэза.

Кальция пантотенат - играет важную роль в процессах ацетилирования и окисления; способствует построению, регенерации эпителия и эндотелия.

Аскорбиновая кислота (витамин C) - обеспечивает синтез коллагена; участвует в формировании и поддержании структуры и функции хрящей, костей, зубов; участвует в метаболизме железа, созревании эритроцитов. Витамин С повышает устойчивость организма к инфекциям, снижает воспалительные реакции.

Магний - играет важную роль в регуляции нервно-мышечной активности сердца, участвует во многих ферментативных реакциях, а также в синтезе белка.

Кальций - необходим для формирования костей, проведения нервных импульсов, сокращения скелетных и гладких мышц, свертывания крови.

Йод - необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, регулирующих физическое и психическое развитие.

Показания к применению

Профилактика дефицита витаминов и минеральных веществ, входящих в состав препарата, у детей от 3 до 10 лет:

- после перенесенных инфекционных заболеваний;

- при повышенных физических и умственных нагрузках;
- при регулярных спортивных занятиях;
- при недостаточном и несбалансированном питании.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Детский возраст до 3 лет.

Гипервитаминоз А. Гипервитаминоз D.

Нарушение функции щитовидной железы.

Фенилкетонурия.

Дефицит сахаразы/изомальтозы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат показан для применения у детей в возрасте от 3 до 10 лет, поэтому данные о применении препарата в период беременности и грудного вскармливания отсутствуют. Исходя из качественного и количественного состава препарата, применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь после еды. Таблетку следует разжевать и запить небольшим количеством воды.

Детям от 3 до 6 лет по 1 таблетке 1 раз в день, от 6 до 10 лет - по 1 таблетке 2 раза в день.

Длительность применения препарата - 1 месяц.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

При многократном превышении терапевтической дозы возможно возникновение рвоты, диареи, мышечной слабости, обусловленных гипервитаминозом витамином А и D3.

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу.

Лечение: временное прекращение приема препарата, промывание желудка, прием активированного угля внутрь, симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не рекомендуется одновременное применение других поливитаминных комплексов во избежание передозировки.

Препарат содержит кальций, поэтому задерживает всасывание в кишечнике антибиотиков из группы тетрациклинов и фторхинолинов.

Особые указания

Во избежание передозировки следует строго соблюдать режим дозирования препарата.

При возникновении аллергических реакций на компоненты препарата следует отменить препарат.

Возможно окрашивание мочи в ярко-желтый цвет, что совершенно безвредно и объясняется наличием в составе препарата рибофлавина.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает негативного влияния на способность к вождению автотранспорта и выполнению других потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки жевательные для детей [банановые, вишневые].

По 30, 60, 90, 100 или 120 таблеток в банки полимерные, укупоренные крышками навинчиваемыми и обтянутые термоусадочной трубкой. Каждую банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускается без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей

ПАО «Отисифарм», Россия

123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10

Тел.: +7 (800) 775-98-19

Факс: +7 (495) 221-18-02

www.otcpharm.ru

Производитель

ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»

450077, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 28,

тел./факс: (347) 272 92 85,

www.pharmstd.ru

Представитель
ПАО «Отисифарм» Е.В. Толстова