МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

**Компливит® - Актив**

**таблетки, покрытые пленочной оболочкой**

ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод»

(ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 110712 20___ г.

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| **Особые указания**<br>При возникновении аллергических реакций следует отменить препарат. Не рекомендуется одновременное применение других поливитаминных комплексов во избежание передозировки. Возможное окрашивание мочи в ярко-желтый цвет, что совершенно безвредно и объясняется наличием в составе препарата рибофлавина.<br><br>**Условия хранения**<br>В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.<br>Хранить и недоступном для детей месте. | **Особые указания**<br>При возникновении аллергических реакций следует отменить препарат. Не рекомендуется одновременное применение других поливитаминных комплексов во избежание передозировки. Возможно окрашивание мочи в ярко-желтый цвет, что совершенно безвредно и объясняется наличием в составе препарата рибофлавина.<br>**Условия хранения**<br>При температуре не выше 25 °С.<br>Хранить в недоступном для детей месте. |

Представитель
ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»



Е.В. Толстова