МИНЗДРАВ РОССИИ
Р N002961/01- 150120
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Компливит®-Актив

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод»

(ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Россия

Изменение № 6

Дата внесения Изменения «____» 150120 20 ___г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на одну таблетку	**Состав на одну таблетку**
Витамин А (ретинола ацетат) (в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 2300 МЕ, сахарозу - 0,161 мг, крахмал модифицированный - 0,828 мг, натрий-алюминия силикат - 0,0138 мг, бутилгидрокситолуол - 0,00644 мг, желатин - 1,15 мг, воду очищенную до 4,6 мг) - 0,7912 мг (2300 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)	**Витамин А (ретинола ацетат)** (в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 2300 МЕ, сахарозу - 0,161 мг, крахмал модифицированный - 0,828 мг, натрий-алюминия силикат - 0,0138 мг, бутилгидрокситолуол - 0,00644 мг, желатин - 1,15 мг, воду очищенную до 4,6 мг) - 0,7912 мг (2300 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)
Витамин Е (α-токоферола ацетат) (в виде порошка, содержащего dl-альфа-Токоферола ацетат - 10,00 мг, мальтодекстрин - 4,9 мг, модифи- - 10,00 мг (в пересчете на 100 % вещество)	**Витамин Е (α-токоферола ацетат)** (в виде порошка, содержащего DL-α-токоферола ацетат - 10,00 мг, желатин - 3,40 мг, сахарозу - 0,94 мг, - 10,00 мг (в пересчете на 100 % вещество)

Старая редакция	Новая редакция
цированный пищевой крахмал - 4,9 мг, кремния диоксид - 0,2 мг)	кукурузный крахмал - 4,00 мг, натрия-алюминия силикат (Е 554) - 0,26 мг, воду до 20,00 мг)
Витамин B_1 (тиамина гидрохлорид) - 1,00 мг	**Витамин B_1 (тиамина гидрохлорид)** - 1,00 мг
Витамин B_2 (рибофлавин) - 1,00 мг	**Витамин B_2 (рибофлавин)** - 1,00 мг
Витамин B_6 (пиридоксина гидрохлорид) - 1,50 мг	**Витамин B_6 (пиридоксина гидрохлорид)** - 1,50 мг
Витамин С (аскорбиновая кислота) - 50,00 мг	**Витамин С (аскорбиновая кислота)** - 50,00 мг
Никотинамид - 7,50 мг	**Никотинамид** - 7,50 мг
Фолиевая кислота - 0,2 мг	**Фолиевая кислота** - 0,2 мг
Рутин (рутозид) - 10,00 мг	**Рутин (рутозид)** - 10,00 мг
Кальция пантотенат - 5,00 мг	**Кальция пантотенат** - 5,00 мг
Витамин B_{12} (цианокобаламин) - 0,003 мг	**Витамин B_{12} (цианокобаламин)** - 0,003 мг
Эргокальциферол - 0,0025 мг (100 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество) (в виде маслянистой жидкости, содержащей эргокальциферол - 100 МЕ, соевых бобов масло рафинированное, дезодорированное до 0,0005 мл)	**Эргокальциферол** - 0,0025 мг (100 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество) (в виде маслянистой жидкости, содержащей эргокальциферол - 100 МЕ, соевых бобов масло рафинированное, дезодорированное до 0,0005 мл)
Фосфор (в виде кальция гидрофосфата дигидрата) - 27,00 мг	**Фосфор (в виде кальция гидрофосфата дигидрата)** - 27,00 мг
Железо (в виде железа фумарата) - 10,00 мг	**Железо (в виде железа фумарата)** - 10,00 мг
Марганец (в виде марганца сульфата моногидрата) - 1,00 мг	**Марганец (в виде марганца сульфата** - 1,00 мг

Старая редакция	Новая редакция
Медь - 1,00 мг **(в виде меди сульфата пентагидрата)** **Цинк** - 5,00 мг **(в виде цинка сульфата гептагидрата)** **Магний** - 22,00 мг **(в виде магния оксида)** **Кальций** - 35,00 мг **(в виде кальция гидрофосфата дигидрата)** **Селен** - 0,01 мг **(в виде натрия селенита)** **Йод** - 0,10 мг **(в виде натрия йодида)** **Фтор** - 0,50 мг **(в виде натрия фторида)** *Вспомогательные вещества:* тальк - 2,20 мг, крахмал картофельный - 133,0 мг, лимонной кислоты моногидрат - 16,63 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 8,75 мг, кальция стеарат - 6,78 мг, стеариновая кислота - 4,54 мг, колликоат® Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,22 мг, сахароза (сахар белый) - 119,1995 мг. *Состав оболочки:* гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) - 8,395 мг, макрогол (макрогол-4000, полиэтиленоксид-4000) - 3,197 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 8,71 мг, титана диоксид - 5,703 мг, тальк - 5,776 мг, инди-	**моногидрата)** **Медь** - 1,00 мг **(в виде меди сульфата пентагидрата)** **Цинк** - 5,00 мг **(в виде цинка сульфата гептагидрата)** **Магний** - 22,00 мг **(в виде магния оксида)** **Кальций** - 35,00 мг **(в виде кальция гидрофосфата дигидрата)** **Селен** - 0,01 мг **(в виде натрия селенита)** **Йод** - 0,10 мг **(в виде натрия йодида)** **Фтор** - 0,50 мг **(в виде натрия фторида)** *Вспомогательные вещества:* тальк - 2,20 мг, крахмал картофельный - 133,0 мг, лимонной кислоты моногидрат - 16,63 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 8,75 мг, кальция стеарат - 6,78 мг, стеариновая кислота - 4,54 мг, колликоат® Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,22 мг, сахароза (сахар белый) - 119,1995 мг. *Состав оболочки:* гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) - 8,395 мг, макрогол (макрогол-4000, полиэтиленоксид-4000) - 3,197 мг, повидон (поливинилпирролидон

Старая редакция	Новая редакция
гокармин - 0,044 мг, краситель хинолиновый желтый (Е 104) - 0,175 мг.	низкомолекулярный, повидон К-17) - 8,71 мг, титана диоксид - 5,703 мг, тальк - 5,776 мг, индигокармин - 0,044 мг, краситель хинолиновый желтый (Е 104) - 0,175 мг.
Противопоказания Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 7 лет. Гипервитаминоз А, гипервитаминоз D; повышенное содержание кальция в организме (гиперкальциемия, гиперпаратиреоз, тиреотоксикоз, саркоидоз), повышенное содержание железа в организме (гемосидероз, гемохроматоз, сидероахрестическая анемия). Не рекомендуется применение при В12-дефицитной анемии.	**Противопоказания** Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция или сахаразно-изомальтазная недостаточность. Детский возраст до 7 лет. Гипервитаминоз А, гипервитаминоз D; повышенное содержание кальция в организме (гиперкальциемия, гиперпаратиреоз, тиреотоксикоз, саркоидоз), повышенное содержание железа в организме (гемосидероз, гемохроматоз, сидероахрестическая анемия). Не рекомендуется применение при В12-дефицитной анемии.

Представитель
АО «Отисифарм» Е.В. Толстова