ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ
ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
ПИКОВИТ® Д
PIKOVIT® D

Регистрационное номер:

Торговое патентованное название: ПИКОВИТ® Д

Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой.

Состав:

1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит:

Активные вещества:

Ретинола пальмитат концентрат*, синтетический, масляная форма (витамин А)	0,35 мг
Колекальциферол концентрат**, масляная форма (витамин D3)	0,08 мг
Аскорбиновая кислота (витамин С)	10 мг
Тиамина мононитрат (витамин В1)	0,25 мг
Рибофлавин (витамин В2)	0,3 мг
Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6)	0,3 мг
Цианокобаламин 0,1% в маннитоле (витамин В12)	0,2 мг
Никотинамид	3 мг
Фолиевая кислота	0,04 мг
Кальция пантотенат	1,2 мг
Кальция гидрофосфат (безводный)	43 мг

Вспомогательные вещества: маннитол, ароматизатор малиновый, полисорбат 80, глицерол, касторовое масло, мальтитол***, магния стеарат, воск эмульсионный (Капол 600 Фарма), повидон, кремния диоксид коллоидный, безводный, малтитол.

1 таблетка, покрытая оболочкой, **желтого цвета** дополнительно содержит: титана диоксид (Е 171) и бетакаротен 1% CWS (Е 160а).

1 таблетка, покрытая оболочкой, **оранжевого цвета** дополнительно содержит: титана диоксид (Е 171) и бетакаротен 10 % CWS (Е 160а).

1 таблетка, покрытая оболочкой **зеленого цвета** содержит: краситель индигокармин (Е 132), краситель хинолиновый желтый (Е 104), титана диоксид (Е 171).

1 таблетка, покрытая оболочкой **красного цвета** дополнительно содержит: краситель железа оксид красный (Е 172).

* - ретинола пальмитат концентрат содержит: ретинола пальмитат, бутилгидроксианизол и бутилгидрокситолуол.

** - колекальциферол концентрат содержит: колекальциферол, DL-α-токоферол и триглицериды среднецепочные жирных кислот.

*** - в процессе производства используется мальтитол в виде 75% раствора.

Описание:

Круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой светло-желтого, оранжевого, зеленого и красно-коричневого цвета. Допускаются вкрапления.

Фармакотерапевтическая группа: поливитаминное средство + мультиминерал.

Код АТХ: [A11AA03]

Фармакологические свойства

ПИКОВИТ® Д содержит 10 наиболее важных витаминов, а также кальций и фосфор.

Витамины группы В (B_1, B_2, B_6, B_{12}), пантотеновая кислота и никотинамид участвуют в метаболизме углеводов, белков и жиров. Фолиевая кислота неактивна, однако в организме она превращается в биологически активный кофермент – тетрагидрофолиевую кислоту, который необходим для биосинтеза нуклеиновых кислот. Он усиливает рост и участвует в созревании эритроцитов. Фолиевая кислота участвует в образовании и регенерации тромбоцитов и их функции. Витамин А необходим для развития эпителиальных клеток и синтеза

зрительного пигмента. Витамин D участвует в обмене кальция и способствует правильной минерализации костей и зубов. Витамин С ускоряет абсорбцию железа и принимает участие во многих окислительно-восстановительных процессах в организме.
Кальций и фосфор играют ключевую роль в минерализации костей и зубов. Ионы кальция активизируют многочисленные ферменты, они принимают участие в регулировании тонуса сердечной мышцы, в передаче нервных импульсов и регулируют проницаемость мембран клеток.
Водорастворимые витамины (витамины группы В, витамин С и биотин) хорошо абсорбируются в количествах, соответствующих суточным потребностям организма. Количества, превышающие уровень насыщения тканей, выводятся почками и в меньшей степени, через желудочно-кишечный тракт. После перорального приема жирорастворимые витамины А и D хорошо абсорбируются в тонкой кишке в присутствии жиров. Более высокие количества жирорастворимых витаминов накапливаются в печени и, поэтому, являются более токсичными, чем водорастворимые витамины.

ПИКОВИТ® Д – витаминно-минеральные таблетки не содержат сахар. Таблетки ПИКОВИТ® Д содержат подслащивающие вещества малтитол и маннитол. Они не оказывают неблагоприяного воздействия на зубы.

Показания к применению.
Состояния, сопровождающиеся повышенной потребностью у детей в витаминах, кальции и фосфоре:
- снижение или отсутствие аппетита,
- переутомление детей школьного возраста,
- в качестве вспомогательной терапии при приеме антибиотиков,
- неполноценное и несбалансированное питание в том числе, в результате недостаточного потребления свежих овощей и фруктов.

Противопоказания.
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Гипервитаминоз А и D. Тяжелая почечная недостаточность (КК менее 30 мл/мин). Детский возраст до 4-х лет.

Способ применения и дозы
Таблетки следует держать во рту до полного растворения.
Детям в возрасте от 4 до 6 лет: по 1 таблетке 4 - 5 раз в день.
Детям в возрасте от 7 до 14 лет: по 1 таблетке 5 - 7 раз в день.
Курс лечения - 1 месяц, необходимость более длительного приема определяется врачом.
Прием препарата детьми до 14 лет по рекомендации врача.

Побочное действие
Аллергические реакции (в этих случаях, следует прекратить прием препарата и проконсультироваться у врача).

ПИКОВИТ® Д содержит 0,9 г малтитола, в связи с этим, прием доз, превышающих рекомендуемые, может вызвать диарею.

Передозировка
Длительный прием (более 1 месяца) очень высоких доз может привести к гипервитаминозу D и А; однако риск передозировки при приеме Пиковита Д маловероятен.
Длительный прием высоких доз витамина В6 может привести к случаю периферической нейропатии. Маннитол и малтитол недостаточно абсорбируется в желудочно-кишечном тракте и в высоких дозах могут привести к диареи и метеоризму. Слабительный эффект развивается

при приеме более 60 г малтитола (66 таблеток, покрытых оболочкой) или более 10 г маннитола (68 таблеток, покрытых оболочкой) в день. Лечение симптоматическое.

Особые указания.
Не следует давать детям более высокие дозы, чем рекомендуется.
Продолжительный прием высоких доз может вызвать гипервитаминоз А и D, хотя вероятность передозировки минимальна.
При необходимости одновременного приема других поливитаминно-минеральных комплексов проконсультируйтесь у врача.

Больные сахарным диабетом могут принимать ПИКОВИТ® Д. В то же время, следует помнить, что одна пастилка содержит 0,9 г малтитола, т.е. суточная доза составляет 3,6-6,3 г малтитола. Для метаболизма малтитола необходим инсулин, хотя благодаря медленному гидролизу и всасыванию в желудочно-кишечном тракте, потребность в инсулине мала.
Энергетическая ценность малтитола (10 кДж/г или 2,4 ккал/г) меньше, чем в сахарозе.

Форма выпуска:
Таблетки, покрытые оболочкой. По 10 таблеток в блистере. По 3 блистера (блистер по 10 таблеток) в пачке картонной вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения.
В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.
3 года.
Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек.
Без рецепта.

Производитель:
КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения.

По всем вопросам обращаться по адресу Представительства в РФ:
123022, Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41.
Тел.: (495) 739-66-00, факс: (495) 739-66-01

При расфасовке и/или упаковке на российском предприятии указывается:

ООО "КРКА-РУС", 143500, Россия, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50
Тел.: (495) 994-70-70
Факс: (495) 994-70-78
Или

ЗАО «ВЕКТОР-МЕДИКА», 630559 Россия, п. Кольцово Новосибирской обл.,
тел./факс: (383) 336-65-00

И.о. директора ИПКЭЛС А.Н. Васильев

Представитель фирмы КРКА О.А.Цибульская