ЛСР-002242/07 от 20.02.2023

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.02.2023 № 3168
(Входящий МЗ № 4232174)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Селмевит® Интенсив

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод»
(ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Россия

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «____» _____ 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на одну таблетку Действующие вещества: **Витамин А** (ретинола ацетат) (в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 2907 МЕ, сахарозу - 0,2035 мг, крахмал модифицированный - 1,0465 мг, натрий-алюминия силикат - 0,0174 мг, бутилгидрокситолуол - 0,0081 мг, желатин - 1,4535 мг, воду очищенную до 5,8140 мг) - 1 мг (2907 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество) **Витамин Е** (α-токоферола ацетат) (в виде порошка, содержащего dl-альфа-Токоферола ацетат - 15,00 мг, мальтодекстрин - 7,35 мг, модифицированный пищевой крахмал - 7,35 мг, кремния диоксид - 0,30 мг) - 15 мг (в пересчете на 100 % вещество)	**Состав на одну таблетку** *Действующие вещества:* **Витамин А** (ретинола ацетат) (в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 2907 МЕ, сахарозу - 0,2035 мг, крахмал модифицированный - 1,0465 мг, натрий-алюминия силикат - 0,0174 мг, бутилгидрокситолуол - 0,0081 мг, желатин - 1,4535 мг, воду очищенную до 5,8140 мг) - 1 мг (2907 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество) **Витамин Е** (α-токоферола ацетат) (в виде порошка, содержащего dl-альфа-Токоферола ацетат - 15,00 мг, мальтодекстрин - 7,35 мг, модифицированный пищевой крахмал - 7,35 мг, кремния диоксид - 0,30 мг) - 15 мг (в пересчете на 100 % вещество)

152881

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.02.2023 № 3168
(Входящий МЗ № 4232174)

Старая редакция	Новая редакция
Витамин B_1 (тиамина гидрохлорид) - 5 мг	**Витамин B_1** (тиамина гидрохлорид) - 5 мг
Витамин B_2 (рибофлавин) - 5 мг	**Витамин B_2** (рибофлавин) - 5 мг
Витамин B_6 (пиридоксина гидрохлорид) - 5 мг	**Витамин B_6** (пиридоксина гидрохлорид) - 5 мг
Витамин С (аскорбиновая кислота) - 60 мг	**Витамин С** (аскорбиновая кислота) - 60 мг
Никотинамид - 30 мг	**Никотинамид** - 30 мг
Фолиевая кислота - 400 мкг	**Фолиевая кислота** - 400 мкг
Рутозид (рутин) (в виде рутозида тригидрата - 27,21 мг) - 25 мг (в пересчете на 100 % вещество)	**Рутозид** (рутин) (в виде рутозида тригидрата - 27,21 мг) - 25 мг (в пересчете на 100 % вещество)
Кальция пантотенат - 15 мг	**Кальция пантотенат** - 15 мг
Витамин B_{12} (цианокобаламин) - 3 мкг	**Витамин B_{12}** (цианокобаламин) - 3 мкг
Тиоктовая кислота (липоевая кислота) - 25 мг	**Тиоктовая кислота** (липоевая кислота) - 25 мг
Цинк (в виде цинка оксида) - 7,5 мг	**Цинк** (в виде цинка оксида) - 7,5 мг
Магний (в виде магния гидрофосфата тригидрата) - 27,9 мг	**Магний** (в виде магния гидрофосфата тригидрата) - 27,9 мг
Селен (в виде натрия селенита) - 50 мкг	**Селен** (в виде натрия селенита) - 50 мкг
Фосфор (в виде магния гидрофосфата тригидрата) - 35,5 мг	**Фосфор** (в виде магния гидрофосфата тригидрата) - 35,5 мг
Вспомогательные вещества: лудипресс (лактозы моногидрат - 93,0 %, повидон - 3,5 %, кросповидон - 3,5 %) - 7,94 мг,	*Вспомогательные вещества:* лактоза / кросповидон / повидон (лактозы моногидрат - 93,0 %, повидон - 3,5 %, кросповидон -

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.02.2023 № 3168
(Вх. Минздрав №4232174)

Старая редакция	Новая редакция
повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 3,70 мг, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) - 1,19 мг, магния стеарат - 7,94 мг, тальк - 7,94 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 40,46 мг, колликоат® Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,22 мг, сахароза (сахар белый) - 78,973 мг, крахмал картофельный - 133,75 мг. *Состав оболочки:* опадрай оранжевый (опадрай II оранжевый 57М230000) (в виде порошка, содержащего гипромеллозу 15 сП, полидекстрозу, титана диоксид, хинолиновый желтый алюминиевый лак, тальк, мальтодекстрин/декстрин, глицерин/глицерол, солнечный закат желтый алюминиевый лак, железа оксид желтый, железа оксид черный) - 35,00 мг.	3,5 %), повидон К-17 (поливинилпирролидон низкомолекулярный К-17) - 3,70 мг, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) - 1,19 мг, магния стеарат - 7,94 мг, тальк - 7,94 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 40,46 мг, макрогола и поливинилового спирта сополимер / поливиниловый спирт / диоксид кремния (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 % / поливиниловый спирт 35-45 % / диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,22 мг, сахароза (сахар белый) - 78,973 мг, крахмал картофельный - 133,75 мг. Пленочная оболочка оранжевого цвета (в виде порошка, содержащего гипромеллозу 15 сП, полидекстрозу, титана диоксид, хинолиновый желтый алюминиевый лак, тальк, мальтодекстрин/декстрин, глицерин/глицерол, солнечный закат желтый алюминиевый лак, железа оксид желтый, железа оксид черный) - 35,00 мг.

Представитель
АО «Отисифарм» Е.В. Толстова

МЗ РФ
ФГБУ ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА НЦЭСМП
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5