ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

СУПРАДИН ®

Регистрационный номер

Торговое название препарата СУПРАДИН®

Международное непатентованное название

Лекарственная форма Таблетки шипучие

Состав -1 шипучая таблетка содержит

активные вещества:

- Витамин А (ретинола пальмитат).....3333 МЕ
- Витамин В1 (тиамина гидрохлорид).....20 мг
- Витамин В2 (рибофлавин).....5 мг
- Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид).....10 мг
- Витамин В12 (цианокобаламин).....5 мкг
- Витамин С (аскорбиновая кислота).....150 мг
- Витамин D3 (колекальциферол).....500 МЕ
- Витамин Е (альфа-токоферола ацетат).....10 мг
- Биотин .....0,25 мг
- Кальция пантотенат .....11,6 мг
- Фолиевая кислота .....1 мг
- Никотинамид .....50 мг

а также минералы и микроэлементы:

- Кальций (фосфат, пантотенат).....51,3 мг

- Магний (фосфат).....5 мг
- Железо (карбонат, сахарат).....1,25 мг
- Марганец (сульфат).....0,5 мг
- Фосфор (фосфат).....47 мг
- Медь (сульфат).....0,1 мг
- Цинк (сульфат).....0,5 мг
- Молибден (молибдат).....0,1 мг

вспомогательные вещества: лимонный ароматизатор Permaseal 60/827-71, лимонный ароматизатор Permastable 3206, маннитол, сахароза, сахарин натрия, натрия гидрокарбонат, тартаровая кислота.

Описание Цилиндрическая, плоская таблетка от бледно-желтого до светло-желтого цвета, с вкраплениями более темного и более светлого цвета, растворяется в воде с выделением пузырьков, образуя зеленовато-желтый, непрозрачный, с небольшим осадком раствор, с запахом лимона.

Фармакотерапевтическая группа Средство, влияющее на метаболические процессы; поливитаминно-минеральный комплекс.

Код АТХ : A11AA04

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Определяются комплексом входящих в состав витаминов и минералов. Супрадин содержит 12 витаминов в сочетании с минералами и редкими элементами, являющихся важными факторами метаболических процессов.

Витамины необходимы для метаболизма углеводов, образования запасов энергии, метаболизма липидов, нуклеиновых кислот и белков, а также для синтеза коллагена, нейромедиаторов и т.д.

Помимо участия в основных метаболических реакциях, витамины принимают участие в регуляции и координации метаболических процессов. Витамины необходимы для роста костей, заживления ран, для поддержания нормального состояния сосудов, микросомального метаболизма лекарств и детоксикации, иммунного статуса, для развития и дифференциации тканей и т.д.

За исключением известных последствий острой недостаточности витаминов, растущий организм проявляет определенную потребность в витаминах, что позволяет предупреждать заболевания и поддерживать умственное и физическое состояние на высоком уровне.

Недостаток витаминов наблюдается в следующих случаях:

- при увеличенной потребности (период роста, беременности, период грудного вскармливания, в пожилом возрасте, при выздоровлении, лечении антибиотиками и при химиотерапии);

- при сниженном поступлении (снижение веса и другие несбалансированные диеты, в пожилом возрасте, желудочно-кишечные заболевания).

При указанных состояниях редко наблюдается недостаток только одного из витаминов. Кроме того, нарушается поступление наиболее распространенных минералов и редких элементов.

Препарат Супрадин создан как полный мультивитаминный комплекс, способствующий предупреждению общих авитаминозов и позволяющий проводить их лечение.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат применяют при профилактике и лечении гипо- и авитаминозов и недостатке минеральных веществ, в том числе:

- при неполноценном и несбалансированном питании (диеты);
- при повышенных физических и умственных нагрузках;
- в период выздоровления после продолжительных и/или тяжело протекающих заболеваний, в том числе инфекционных;
- в комплексной терапии хронического алкоголизма;
- в комплексном лечении при назначении антибиотикотерапии, химиотерапии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Гиперчувствительность, в том числе при аллергии на один или несколько компонентов препарата, а также при наличии гипервитаминоза А или D, гиперкальциемии, почечной недостаточности и в период лечения ретиноидами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Внутрь, предварительно растворив в стакане воды.

Взрослые и подростки старше 12 лет: 1 шипучая таблетка в день, или по указанию врача. Без рекомендации врача препарат не следует принимать в дозах, превышающих вышеуказанные, а также детям до 12 лет.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Аллергические реакции к компонентам препарата.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Не принимать одновременно другие поливитаминные препараты.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что совершенно безвредно, и объясняется наличием в препарате рибофлавина.

Таблетка содержит около 300 мг натрия (эквивалентно 700 мг поваренной соли). Пациентам, соблюдающим диету с минимальным потреблением соли, рекомендуется принимать драже.

Таблетка содержит около 1000 мг кристаллического сахара (сахарозы). При приеме рекомендованной суточной дозе это количество пренебрежимо мало даже при необходимости соблюдения противодиабетической диеты (1г кристаллического сахара соответствует 0,1 хлебной единицы).

БЕРЕМЕННОСТЬ И ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

Можно принимать во время беременности и период грудного вскармливания при условии соблюдения рекомендуемой ежедневной дозы. Нет данных, указывающих на риск для плода в случае приема препарата в рекомендованных дозах во время беременности.

ФОРМА ВЫПУСКА

Алюминиевый или полипропиленовый цилиндр, с пластиковой крышкой и дессикантом, содержащий 10 шипучих таблеток, завернутых в фольгу Al/бумага. 1 или 2 цилиндра и инструкция по применению в картонной коробке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре ниже 25°С, предохранять от нагревания и влаги, в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

ОТПУСК ИЗ АПТЕК

Без рецепта врача.

Фирма-производитель:
«Байер Консьюмер Кэр АГ»(Швейцария), произведено «Байер Санте Фамильяль», Франция

Юридический адрес производителя:
Байер Санте Фамильяль , F-74240, рю д'Индюстри 33, Франция.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:
129010, Москва, Грохольский пер.13, стр.2.
Тел.: +7 (095) 234-20-90
Факс: +7(095) 234-20-70

Директор ИДКЭЛС В.В.Чельцов

Представитель фирмы