МИНЗДРАВ РОССИИ
140622
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Супрадин®

наименование лекарственного препарата

Поливитамины + Минералы

группировочное наименование

таблетки шипучие

лекарственная форма, дозировка

АО «БАЙЕР», Россия,

произведено Делфарм Гайярд, Франция

наименование производителя, страна

Изменение № 7

Дата внесения Изменения «____» 140622 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав	**Состав**
1 таблетка содержит	1 таблетка содержит
Действующие вещества:	*Действующие вещества:*
Витамин А (витамин А пальмитат)[1] 3333 МЕ	Ретинола пальмитат (витамин А)[1] 3333 МЕ
Витамин B_1 (тиамина гидрохлорид)[2] 20,0 мг	Тиамина гидрохлорид (витамин B_1)[2] 20,0 мг
Витамин B_2 (рибофлавин)[3] 5,0 мг	Рибофлавин (витамин B_2) [3] 5,0 мг
Витамин B_6 (пиридоксина гидрохлорид) 10,0 мг	Пиридоксина гидрохлорид (витамин B_6) 10,0 мг
Витамин B_{12} (цианокобаламин)[4] 5,0 мкг	Цианокобаламин (витамин B_{12}) 5,0 мкг
Витамин С (аскорбиновая кислота) 150,0 мг	Аскорбиновая кислота (витамин С) 150,0 мг
Витамин D_3 (колекальциферол)[5] 500 МЕ	Колекальциферол (витамин D_3)[4] 500 МЕ
Витамин Е (DL-альфа-токоферила ацетат) 10,0 мг	DL-альфа-токоферила ацетат (витамин Е) 10,0 мг
Биотин 0,25 мг	Биотин 0,250 мг
Кальция пантотенат 11,6 мг	Кальция пантотенат (витамин B_5) 11,6 мг
Фолиевая кислота 1,0 мг	Фолиевая кислота 1,0 мг
	Никотинамид (витамин B_3) 50,0 мг

142489

Старая редакция	Новая редакция
Никотинамид 50,0 мг а также минералы и микроэлементы Кальций (в форме кальция глицерофосфата и кальция пантотената)[6] 51,3 мг Магний (в форме магния глицерофосфата) 5,0 мг Железо (в форме железа карбоната, сахарата) 1,25 мг Марганец (в форме марганца сульфата (моногидрата)) 0,5 мг Фосфор (в форме кальция глицерофосфата, в форме магния глицерофосфата, в форме тиамина монофосфорной кислоты эфира хлорида) [7,8] 47,0 мг Медь (в форме меди сульфата (безводного)) 0,1 мг Цинк (в форме цинка сульфата (моногидрата)) 0,5 мг Молибден (в форме натрия молибдата (дигидрата)) 0,1 мг	а также минералы и микроэлементы Кальций (в форме кальция глицерофосфата и кальция пантотената)[5] 51,3 мг Магний (в форме магния глицерофосфата) 5,0 мг Железо (в форме субстанции-смеси железа карбоната с сахарозой)[6] 1,25 мг Марганец (в форме марганца сульфата (моногидрата)) 0,5 мг Фосфор (в форме кальция глицерофосфата, в форме магния глицерофосфата, в форме тиамина монофосфорной кислоты эфира хлорида)[7,8] 47,0 мг Медь (в форме меди сульфата (безводного)) 0,1 мг Цинк (в форме цинка сульфата (моногидрата)) 0,5 мг Молибден (в форме натрия молибдата (дигидрата)) 0,1 мг
Вспомогательные вещества: сахароза[9] 1086,384 мг, маннитол 17,25 мг, винная кислота 1600,0 мг, натрия гидрокарбонат 1100,0 мг, сахарин натрия 18,0 мг, лимонный ароматизатор PHS-413330[10] 60,0 мг, лимонный ароматизатор 860032 TD1090[11] 100,0 мг, этанол 96 % [12] qs, вода очищенная[12] qs.	*Вспомогательные вещества*: сахароза[9] до 4700 мг, маннитол 17,250 мг, винная кислота 1600,0 мг, натрия гидрокарбонат 1100,0 мг, натрия сахаринат 18,0 мг, ароматизатор лимонный PHS-413330[10] 60,0 мг, ароматизатор лимонный 860032 TD1090[11] 100,0 мг.
[1] в форме сухого витамина А пальмитата 100 WS 33,33 мг,	[1] в форме витамина А пальмитата 250 CWS/F 13,33 мг, в 1 г содержится: витамин А пальмитат 148 мг, Dl-α-токоферол 1,25 мг, рыбный желатин 300 мг, сахароза 300 мг, крахмал кукурузный 250,75 мг;
[2] в форме тиамина монофосфорной кислоты эфира хлорида дигидрата 24,7 мг;	[2] в форме тиамина монофосфорной кислоты
[3] в форме рибофлавина натрия фосфата ди-	

Старая редакция	Новая редакция
гидрата 6,82 мг; [4] в форме цианокобаламина 0,1 % WS 5,0 мг; [5] в форме колекальциферола 100 CWS 5,0 мг; [6] в форме кальция глицерофосфата 50,0 мг кальция; в форме кальция пантотената 1,3 мг кальция; [7] соответствует примерно 144 мг фосфата; [8] в форме глицерофосфата кальция 38,6 мг фосфора; в форме глицерофосфата магния 6,4 мг фосфора; в форме дигидрата хлорида сложного эфира тиамина монофосфорной кислоты 2,0 мг фосфора; [9] количество сахарозы регулируется в зависимости от содержания витаминов (активности сырья); теоретическое количество сахарозы составляет 1086,384 мг; [10] состав: натуральные и природные идентичные вкусовые вещества, адсорбированные на мальтодекстрине; [11] состав: натуральное лимонное масло, адсорбированное на мальтодекстрине; [12] вспомогательный ингридиент, используемый в процессе производства, отсутствует в конечном продукте.	эфира хлорида дигидрата 24,7 мг; [3] в форме рибофлавина натрия фосфата дигидрата 6,82 мг; [4] в форме колекальциферола 100 CWS 5,0 мг; [5] в форме кальция глицерофосфата 50,0 мг кальция, в форме кальция пантотената 1,3 мг кальция; [6] железо (в форме субстанции-смеси железа карбоната с сахарозой): железа карбонат 25 %, сахароза 75 %; [7] соответствует примерно 144 мг фосфата; [8] в форме глицерофосфата кальция 38,6 мг фосфора, в форме глицерофосфата магния 6,4 мг фосфора, в форме дигидрата хлорида сложного эфира тиамина монофосфорной кислоты 2,0 мг фосфора; [9] количество сахарозы регулируется в зависимости от содержания витаминов (активности сырья); теоретическое количество сахарозы составляет: 1122,85 мг с учетом стабильности, 1116,99 мг с учетом стабильности и производственного излишка; [10] состав: натуральные и природные идентичные вкусовые вещества, адсорбированные на мальтодекстрине; [11] состав: натуральное лимонное масло, адсорбированное на мальтодекстрине. Примечание: - этанол 96 % (в составе связующего раствора на стадии влажной грануляции); - вода очищенная (на стадии влажной грануляции)

Старая редакция	Новая редакция
	используются в производстве и не присутствуют в готовом препарате, так как испаряются в процессе производства.
Форма выпуска Таблетки шипучие. По 10 таблеток, завернутых в фольгу Al/бумага, помещают в алюминиевый или полипропиленовый цилиндр, закрытый пластиковой крышкой с контролем первого вскрытия. В крышку помещен влагопоглотитель. 1 или 2 цилиндра вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.	**Форма выпуска** Таблетки шипучие. По 10 таблеток, завернутых в фольгу Al/бумага, помещают в алюминиевый или полипропиленовый цилиндр, закрытый крышкой из полиэтилена низкой плотности (LDPE) с контролем первого вскрытия. В крышку помещен влагопоглотитель. 1, 2 или 3 цилиндра вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку
Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.	**Срок годности** 2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Менеджер по регистрации Олейник Е.Ф.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАЙЕР» * ОГРН 1027739373903 * МОСКВА *
АО «БАЙЕР»
АО BAYER

ФГБУ НЦЭСМП
МЗ РФ
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ
ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

142489