ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

АНТИОКСИКАПС С СЕЛЕНОМ

Регистрационный номер:
Торговое название препарата: АНТИОКСИКАПС С СЕЛЕНОМ
МНН или группировочное название: поливитамины + прочие препараты.
Лекарственная форма: капсулы.

Состав
1 капсула содержит:
Активные компоненты:
бетакаротен - 6 мг (в виде 30% масляной суспензии) – 20 мг, альфа - токоферола ацетат – 30 мг, аскорбиновая кислота – 100 мг, селена – 0,03 мг (в виде селена дрожжевого 0,1%) - 30,0 мг или (в виде селена дрожжевого 0,2%) - 15,0 мг.
Вспомогательные вещества:
Подсолнечника масло, воск пчелиный, лецитин очищенный.
Состав оболочки желатиновых капсул: желатин фармацевтический, глицерол, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, вода очищенная, титана диоксид, краситель Красный очаровательный Е 129.

Описание
Капсулы мягкие желатиновые продолговатой формы со швом, красного цвета.
Содержимое капсул – масляная суспензия красного цвета с непрогорклым запахом. При хранении возможно расслаивание смеси.

Фармакотерапевтическая группа: Поливитаминное средство + прочие препараты.
Код АТХ [А11АА04].

Фармакологическое действие
Фармакологическая активность Антиоксикапса с селеном обусловлена комплексным действием содержащихся в нем витаминов: кислоты аскорбиновой, альфа - токоферола ацетата, бетакаротена и микроэлемента селена.
Аскорбиновая кислота участвует в регулировании окислительно-восстановительных процессов в организме, активирует углеводно-белковый обмен, увеличивает метаболизм холестерина, повышает свертываемость крови, усиливает регенерацию тканей, синтез стероидных гормонов, коллагена и проколлагена. Она повышает адаптационные возможности организма и усиливает его сопротивляемость к инфекциям.
Альфа-токоферола ацетат ингибирует окисление жиров в организме и образование из них токсических перекисей, стабилизируя прочность двойных связей в ненасыщенных жирных кислотах. Он нормализует структуру и функцию мембран эритроцитов. Токоферол участвует в биосинтезе коллагена, гема и белков, активирует пролиферацию клеток, функцию тканевого дыхания и других важнейших процессов клеточного метаболизма.
Бетакаротен обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием за счет его способности связывать активный кислород и, таким образом, защищать клеточные структуры от разрушения свободными радикалами, образующимися в большом количестве при воздействии неблагоприятных факторов внешней среды или при развитии патологических процессов в организме.

Селен замедляет процесс старения, обладает цитопротективными свойствами, участвует в регуляции эластичности тканей, способствует задержке распространения в организме вирусов и развитию вторичных инфекций у больных. Он является существенной частью ферментной системы глутатионпероксидазы, влияет на активность этого фермента. Глутатионпероксидаза защищает внутриклеточные структуры от повреждающего действия свободных кислородных радикалов, которые образуются как при обмене веществ, так и под влиянием внешних факторов, в том числе ионизирующего излучения.

Показания к применению

- профилактика гипо-, авитаминоза и дефицита селена в организме;
- для повышения защитных функций организма;
- в комплексной терапии климактерического синдрома;
- в период выздоровления после перенесенных заболеваний (особенно протекавших с лихорадочным синдромом);
- для уменьшения отрицательного воздействия неблагоприятной экологической обстановки и вредных привычек (курение, прием алкоголя).

Противопоказания

Гипервитаминоз А и Е; беременность; детский возраст (до 14 лет); гиперчувствительность.

Период беременности и грудного вскармливания

Не рекомендуется применять при беременности и в период лактации.

Способ применения и дозы

Антиоксикапс с селеном принимают после еды, запивая водой.
Если врач не назначил иначе, препарат рекомендуется назначать детям с 14 лет и взрослым по 1 капсуле 1 раз в сутки. Курс лечения – 2-3 месяца.
Повторные курсы по рекомендации врача.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

При передозировке возможно появление запаха чеснока в выдыхаемом воздухе. В этом случае препарат следует отменить.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

- Глюкокортикостероидные препараты, антибиотики тетрациклиновой группы, а также этанол и этанолсодержащие препараты при совместном применении снижают терапевтический эффект бетакаротена.
- Витамин Е может повышать эффективность противосудорожных средств у больных эпилепсией, у которых обнаружено повышенное содержание в крови продуктов перекисного окисления липидов.
- Всасывание витамина С уменьшается при одновременном применении пероральных контрацептивов. Витамин С повышает всасывание железа, увеличивает риск возникновения кристаллурии при лечении салицилатами и сульфаниламидами короткого действия.

Особые указания

Слабительные лекарственные средства, в состав которых входит минеральное масло, и колестирамин снижают усвоение витаминов А и Е.

При проявлении запаха чеснока в выдыхаемом воздухе (симптом передозировки селена) препарат следует отменить.

Форма выпуска

Капсулы.

По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке (в блистере), по 2 контурные ячейковые упаковки (блистера) вместе с инструкцией по применению в пачке из картона коробочного.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

2 года. Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Производитель

УП «Минскинтеркапс», Республика Беларусь,
220075, г. Минск, а/я 112, ул. Инженерная, 26

Директор
УП «Минскинтеркапс» А.В. Бондарев

Республика Беларусь * Республиканское унитарное производственное предприятие * «МИНСКИНТЕРКАПС» * г. Минск *

РОСЗДРАВНАДЗОРА
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 7
ФГБУ НЦЭСМП