ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

АНТИОКСИКАПС С ЦИНКОМ

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: АНТИОКСИКАПС С ЦИНКОМ

МНН или группировочное название: поливитамины + прочие препараты.

Лекарственная форма: капсулы

Состав
1 капсула содержит:
Активные компоненты:
бетакаротен - 6 мг
(в виде 30% масляной суспензии) – 20 мг,
альфа - токоферола ацетат – 30 мг,
аскорбиновая кислота – 100 мг,
цинка оксид – 10 мг
(в пересчете на цинк) - 8 мг.
Вспомогательные вещества: подсолнечника масло, воск пчелиный, лецитин очищенный.
Состав оболочки желатиновых капсул: желатин фармацевтический, глицерол, метилпарагидроксибензоат, вода очищенная, титана диоксид, краситель Красный очаровательный Е 129.

Описание
Капсулы мягкие желатиновые продолговатой формы со швом, красного цвета.
Содержимое капсул – масляная суспензия красного цвета с непрогорклым запахом. При хранении возможно расслаивание смеси.

Фармакотерапевтическая группа: Поливитаминное средство + прочие препараты.
Код АТХ [A11AA04].

Фармакологическое действие
Фармакологическая активность Антиоксикапса с цинком обусловлена комплексным действием содержащихся в нем витаминов: кислоты аскорбиновой, альфа - токоферола ацетата, бетакаротена и микроэлемента цинка.
Аскорбиновая кислота участвует в регулировании окислительно-восстановительных процессов в организме, активирует углеводно-белковый обмен, увеличивает метаболизм холестерина, повышает свертываемость крови, усиливает регенерацию тканей, синтез стероидных гормонов, коллагена и проколлагена. Она повышает адаптационные возможности организма и усиливает его сопротивляемость к инфекциям.
Альфа-токоферола ацетат ингибирует окисление жиров в организме и образование из них токсических перекисей, стабилизируя прочность двойных связей в ненасыщенных жирных кислотах. Он нормализует структуру и функцию мембран эритроцитов. Токоферол участвует в

биосинтезе коллагена, гема и белков, активирует пролиферацию клеток, функцию тканевого дыхания и других важнейших процессов клеточного метаболизма.
Бетакаротен обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием за счет его способности связывать активный кислород и, таким образом, защищать клеточные структуры от разрушения свободными радикалами, образующимися в большом количестве при воздействии неблагоприятных факторов внешней среды или при развитии патологических процессов в организме.
Цинк способствует лучшему усвоению и действию витаминов группы В, является составной частью панкреатического сока, участвует в эндокринной регуляции, формировании психических реакций, образовании ряда гормонов, в т.ч. и половых. Он также участвует в биохимических реакциях организма, в процессе кроветворения. Цинк входит в состав ферментов, защищающих и стабилизирующих клеточные мембраны, участвует в метаболизме нуклеиновых кислот, белков, жиров, углеводов, а также в процессах взаимодействия иммунокомпетентных клеток.

Показания к применению
Профилактика и лечение витаминной (С, Е и А) недостаточности и недостаточности ионов цинка.
Повышение сопротивляемости организма к простудным заболеваниям.
При повышенных физических и умственных нагрузках.
Период восстановления после продолжительных и/или тяжело протекающих заболеваний, в том числе инфекционных.
Астенические состояния различной этиологии.
В комплексной терапии алкогольного абстинентного синдрома и никотиновой зависимости.
При несбалансированном и неполноценном питании.

Противопоказания
Гипервитаминоз А и Е; повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст до 14 лет; беременность.

Период беременности и грудного вскармливания
Не рекомендуется применять при беременности и в период лактации.

Способ применения и дозы
Антиоксикапс с цинком принимают после еды, запивая водой.
С профилактической целью препарат рекомендуется назначать взрослым и детям с 14 лет по 1 капсуле 1 раз в сутки в течение 1-3 месяцев.
Повторные курсы по рекомендации врача.
С лечебной целью препарат применяется согласно вышеуказанным показаниям. Дозы препарата устанавливает врач в зависимости от характера и степени выраженности патологии, а также с учетом потребности организма в витаминах А, С, Е и цинке.

Побочное действие
Возможны аллергические реакции: зуд, крапивница.
При длительном применении высоких доз возможно развитие дефицита меди, анемии.

Передозировка
При превышении суточной нормы после приема Антиоксикапса с цинком возможны неспецифические побочные эффекты в виде тошноты, диареи, покраснения кожи и др. симптомов, которые проходят при отмене препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Кортикостероидные препараты, антибиотики тетрациклиновой группы, а также этанол и этанолсодержащие препараты при совместном употреблении снижают терапевтический эффект бетакаротена.

Витамин Е может повышать эффективность противосудорожных средств у больных эпилепсией, у которых обнаружено повышенное содержание в крови продуктов перекисного окисления липидов, а также витаминов А и Д.

Всасывание витамина С уменьшается при одновременном применении пероральных контрацептивов. Витамин С повышает всасывание железа, увеличивает риск возникновения кристаллурии при лечении салицилатами и сульфаниламидами короткого действия.

Слабительные лекарственные средства, в состав которых входит минеральное масло, и колестирамин снижают усвоение витаминов А и Е.

Особые указания

Избегать употребления молочных продуктов, так как при этом тормозится всасывание солей цинка из пищеварительного тракта.

Избегать употребления спиртных напитков.

Не принимать одновременно с другими поливитаминными препаратами во избежание передозировки.

Форма выпуска

Капсулы.

По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке (блистере), по 2 контурные ячейковые упаковки (блистера) вместе с инструкцией по применению в пачке из картона коробочного.

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

2 года.

Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Производитель

УП «Минскинтеркапс», Республика Беларусь,
220075, г. Минск, а/я 112, ул. Инженерная, 26

Директор
УП «Минскинтеркапс» А.В. Бондарев

ФГУ РОСЗДРАВНАДЗОРА ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ЦЭСЭН