ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ВИТРУМ® БЬЮТИ ЭЛИТ

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: ВИТРУМ® БЬЮТИ ЭЛИТ

МНН или группировочное название: Поливитамины+Прочие препараты&

Лекарственная форма: таблетки покрытые пленочной оболочкой

СОСТАВ: одна таблетка покрытая пленочной оболочкой содержит:

Активные действующие вещества:

Бетакаротен	1,02	мг[1)]
Альфа-токоферола ацетат (Витамин Е)	10	мг[2)]
Колекальциферол (Витамин D_3)	1,68	мкг[3)]
Аскорбиновая кислота (Витамин С)	40	мг
Тиамина мононитрат (Витамин B_1)	2	мг
Рибофлавин (Витамин B_2)	2	мг
Пиридоксина гидрохлорид (Витамин B_6)	5	мг
Никотинамид	10	мг
Пара-аминобензойная кислота	10	мг
Цианокобаламин (Витамин B_{12})	4	мкг
Кальция пантотенат в пересчете на пантотеновую кислоту	10	мг
Фолиевая кислота	133	мкг
Биотин	133	мкг
Кальция гидрофосфат в пересчете на кальций	150	мг
Магния оксид в пересчете на магний	50	мг
Железа аминоат в пересчете на железо	10	мг
Цинка оксид в пересчете на цинк	5	мг
Марганца глюконат в пересчете на марганец	3,33	мг
Калия йодид в пересчете на йод	75	мкг
Кальция гидрофосфат в пересчете на фосфор	155	мг
Селена аминоат в пересчете на селен	8,3	мкг
Бора цитрат в пересчете на бор	0,5	мг
Рутозид	10	мг
Папаин	3,3	мг
Бетаина гидрохлорид	10	мг
Инозитол	20	мг
Холин	50	мг
Цистеин	20	мг
Аргинин	10	мг
Лизин	20	мг
Метионин	20	мг
Алоэ барбадосского листья	25	мг
Чая листьев экстракт	20	мг
Виноградных косточек экстракт	20	мг

Лимона биофлавоноиды	20	мг
Маслины европейской листьев экстракт	20	мг
Ламинарии слоевища	9	мг
Мяты перечной листьев экстракт	5	мг
Имбиря лекарственного корневищ экстракт	3	мг
Крапивы двудомной листьев экстракт	3	мг
Аниса плодов экстракт	3	мг
Куркумы длинной корневища экстракт	2	мг
Хвоща полевого травы экстракт	2	мг
Лаванды цветков экстракт	2	мг
Коричника китайского коры экстракт	1	мг
Розмарина аптечного листьев экстракт	1	мг

1) 1,02 мг бетакаротена соответствует 1700 МЕ бетакаротена;
2) 10 мг альфа-токоферола ацетата соответствует 13,6 МЕ Витамина Е;
3) 1,68 мкг колекальциферола соответствует 67,2 МЕ Витамина D_3

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, стеариновая кислота, кроскармеллоза натрия, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный.
Оболочка: гипромеллоза, титана диоксид, триацетин, краситель кармин красный (Е 120), индигокармин (Е132).

ОПИСАНИЕ
Таблетки овальной формы, двояковыпуклые, покрытые пленочной оболочкой от розовато-фиолетового до темно-фиолетового цвета с синеватым оттенком, с легким специфическим запахом.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА.
Поливитаминное средство + прочие препараты.

КОД АТХ: [A11AB].

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Комбинированный препарат, действие которого определяется свойствами веществ, входящих в состав препарата. Активные компоненты препарата являются важной составной частью ферментативных систем, участвующих в основных метаболических процессах; стимулируют защитные силы организма и процессы регенерации кожи; способствуют улучшению структуры волос и ногтевых пластин; нормализуют работу пищеварительной системы, перистальтику кишечника; укрепляют стенки капилляров, улучшают микроциркуляцию; снижают последствия стрессовых воздействий; обладают антиоксидантным действием, общеукрепляющим действием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Профилактика гиповитаминоза, недостатка минеральных веществ в организме:
- при повышенных физических и умственных нагрузках;
- в период восстановления после заболеваний, в том числе инфекционных;
- при несбалансированном и неполноценном питании.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная индивидуальная чувствительность к любому из компонентов препарата; период беременности и лактации; артериальная гипотензия; тромбофлебит. Не рекомендуется использовать при гипервитаминозе А и D. Детский возраст до 18 лет.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ
Нет достаточных данных о применении препарата во время беременности и лактации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Внутрь. Взрослым по 2 таблетки в день после еды в течение 2-х месяцев. Повторные курсы по рекомендации врача.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Аллергические реакции, кожный зуд, крапивница.

ПЕРЕДОЗИРОВКА
Симптомы передозировки: тошнота, слабость, желудочно-кишечные расстройства.
При случайной передозировке обратиться к врачу.
Лечение: активированный уголь внутрь, промывание желудка, симптоматическое лечение.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
Не рекомендуется одновременный прием других аналогичных поливитаминных комплексов во избежание передозировки.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Не рекомендуется принимать лицам с повышенным риском развития тромбозов: после операций на сердце, сосудах, аортокоронарного шунтирования.
Возможно окрашивание мочи в интенсивный желтый цвет, что не представляет опасности, так как обусловлено наличием рибофлавина в составе препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА
Таблетки покрытые пленочной оболочкой.
30, 60, 90 или 100 таблеток покрытых пленочной оболочкой во флаконе из полиэтилена с завинчивающейся крышкой из того же материала и предохранительным клапаном из фольги. На флакон наклеивают этикетку, флакон затягивают полиэтиленовой пленкой и вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
При температуре 10-30°С, в сухом, защищенном от света месте.
Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ
5 лет. Не использовать по окончании срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Юнифарм, Инк., США
Претензии направлять в адрес:
Представительство в России: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр.1,
тел: (495) 995-77-67, www.unipharm.ru

Представитель фирмы А.М. КРЫЛОВА