МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-004422/09-300718
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Компливит® для женщин 45 плюс

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод»

(ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Россия

Изменение № 5

Дата внесения Изменения «____» 300718 20___г.

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Торговое название препарата: Компливит® для женщин 45 плюс	**Торговое наименование:** Компливит® для женщин 45 плюс
Раздел отсутствует	**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Поливитамины+Прочие препараты
Состав на одну таблетку. **Витамин А** (ретинола ацетат) (в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 1453,5 МЕ, сахарозу - 0,1017 мг, крахмал модифицированный - 0,5233 мг, натрий-алюминия силикат -	**Состав на одну таблетку.** *Действующие вещества* **Витамин А** (ретинола ацетат) (в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 1453,5 МЕ, сахарозу - 0,1017 мг, крахмал модифицированный - 0,5233 мг,
- 0,5 мг (1453,5 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)	- 0,5 мг (1453,5 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)

Старая редакция		Новая редакция	
0,0087 мг, бутилгидрокситолуол - 0,0041 мг, желатин - 0,7268 мг, воду очищенную до 2,907 мг)		натрий-алюминия силикат - 0,0087 мг, бутилгидрокситолуол - 0,0041 мг, желатин - 0,7268 мг, воду очищенную до 2,907 мг)	
Витамин Е (α-токоферола ацетат) (в виде порошка, содержащего dl-альфа-Токоферола ацетат - 15,00 мг, мальтодекстрин - 7,35 мг, модифицированный пищевой крахмал - 7,35 мг, кремния диоксид - 0,3 мг)	- 15 мг (в пересчете на 100 % вещество)	**Витамин Е** (α-токоферола ацетат) (в виде порошка, содержащего dl-альфа-Токоферола ацетат - 15,00 мг, мальтодекстрин - 7,35 мг, модифицированный пищевой крахмал - 7,35 мг, кремния диоксид - 0,3 мг)	- 15 мг (в пересчете на 100 % вещество)
Витамин B_1 (тиамина гидрохлорид)	- 1,7 мг	**Витамин B_1** (тиамина гидрохлорид)	- 1,7 мг
Витамин B_2 (рибофлавин)	- 2 мг	**Витамин B_2** (рибофлавин)	- 2 мг
Витамин B_6 (пиридоксина гидрохлорид)	- 5 мг	**Витамин B_6** (пиридоксина гидрохлорид)	- 5 мг
Витамин С (аскорбиновая кислота)	- 75 мг	**Витамин С** (аскорбиновая кислота)	- 75 мг
Никотинамид	- 10 мг	**Никотинамид**	- 10 мг
Фолиевая кислота	- 400 мкг	**Фолиевая кислота**	- 400 мкг
Рутин (рутозид)	- 25 мг	**Рутин** (рутозид)	- 25 мг
Витамин B_{12} (цианокобаламин)	- 3 мкг	**Витамин B_{12}** (цианокобаламин)	- 3 мкг
Кальция пантотенат	- 5 мг	**Кальция пантотенат**	- 5 мг
Ацетил-L-карнитина гидрохлорид	- 50 мг	**Ацетил-L-карнитина гидрохлорид**	- 50 мг
Магний (в виде магния гидрофосфата тригидрата)	- 27,9 мг	**Магний** (в виде магния гидрофосфата тригидрата)	- 27,9 мг
Селен	- 25 мкг		

Старая редакция	Новая редакция
(в виде натрия селенита) **Цимицифуги корней экстракт сухой** - 10 мг **Пустырника экстракт сухой** - 10 мг *Вспомогательные вещества:* *ядро:* тальк - 11,00 мг, крахмал картофельный - 16,33 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 30,00 мг, магния стеарат - 5,50 мг, лудипресс (лактозы моногидрат - 93,0 %, повидон - 3,5 %, кросповидон - 3,5 %) - 48,89 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 11,00 мг, колликоат® Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,22 мг; *оболочка:* гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) - 4,45 мг, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) - 2,89 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 6,34 мг, титана диоксид - 6,33 мг, тальк - 4,58 мг, макрогол (макрогол-4000, полиэтиленоксид-4000) - 2,75 мг, краситель хинолиновый желтый - 0,13 мг, индигокармин - 0,03 мг. **Описание:** Таблетки круглые двояковыпуклые, покрытые пленочной оболочкой зелёного цвета, с характерным запахом.	**Селен** - 25 мкг (в виде натрия селенита) **Цимицифуги кистевидной корневищ экстракт** - 10 мг **Пустырника травы экстракт** - 10 мг *Вспомогательные вещества:* тальк - 11,00 мг, крахмал картофельный - 16,33 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 30,00 мг, магния стеарат - 5,50 мг, лудипресс (лактозы моногидрат - 93,0 %, повидон - 3,5 %, кросповидон - 3,5 %) - 48,89 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 11,00 мг, колликоат® Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,22 мг. *Состав оболочки:* гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) - 4,45 мг, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) - 2,89 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 6,34 мг, титана диоксид - 6,33 мг, тальк - 4,58 мг, макрогол (макрогол-4000, полиэтиленоксид-4000) - 2,75 мг, краситель хинолиновый желтый - 0,13 мг, индигокармин - 0,03 мг. **Описание.** Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой зеленого цвета. На поперечном разрезе ядро желтовато-коричневого цвета с многочисленными вкраплениями различного цвета.

Старая редакция	Новая редакция
Раздел отсутствует	**Применение при беременности и в период грудного вскармливания** Применение препарата при беременности противопоказано. При необходимости применения препарата в период лактации грудное вскармливание необходимо прекратить.
Раздел отсутствует	**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами** В период лечения необходимо соблюдать осторожность при занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
Форма выпуска Таблетки, покрытые плёночной оболочкой. По 30, 60, 90, 100, 120 таблеток в банки полимерные для витаминов и лекарственных средств. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. Каждую банку или 3, 6 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	**Форма выпуска** Таблетки, покрытые пленочной оболочкой. По 30, 60, 90, 100, 120 таблеток в банки полимерные из полиэтилена низкого давления, укупоренные крышками навинчиваемыми из полиэтилена низкого давления. Каждую банку обтягивают трубкой термоусадочной из пленки поливинилхлоридной. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. Каждую банку или 3, 6 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
Срок годности 1 год 6 месяцев. Не использовать по истечении срока годности.	**Срок годности** 1 год 6 месяцев. Не применять по истечении срока годности,

Старая редакция	Новая редакция
	указанного на упаковке.

Представитель
ПАО «Отисифарм» Е.В. Толстова