

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Ливолин Форте

наименование лекарственного препарата

Регистрационный номер:**Торговое название препарата:** Ливолин Форте**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Поливитамины+Прочие препараты

Лекарственная форма: капсулы**СОСТАВ**

Каждая капсула содержит:

действующие вещества - лецитин соевый (с содержанием фосфатидилхолина 300 мг) 857,13 мг, альфа-токоферола ацетат (Витамин Е) 10 мг, тиамина мононитрат (Витамин В1) 10 мг, рибофлавин (Витамин В2) 6 мг, пиридоксина гидрохлорид (Витамин В6) 10 мг, никотинамид 30 мг, цианокобаламин (Витамин В12) 0,01 мг;

вспомогательные вещества - соевых бобов масло, масло растительное гидрированное, воск пчелиный белый;

состав оболочки капсулы - желатин, глицерол, вода очищенная, титана диоксид (Е171), краситель железа оксид красный (Е172), краситель железа оксид черный (Е172), краситель железа оксид желтый (Е172).

ОПИСАНИЕ

Мягкие желатиновые капсулы коричневого цвета; содержимое капсулы - пастообразная масса темно-желтого цвета.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Гепатопротекторное средство

Код АТХ: А05С

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакодинамика

Комбинированный препарат. Входящие в состав фосфолипиды являются основными элементами в структуре клеточной оболочки и митохондрий. Витамины выполняют функцию коэнзимов в процессах окислительного декарбоксилирования. Препарат предотвращает явления витаминной недостаточности, нормализует углеводный, белковый и жировой обмен, улучшает функциональное состояние печени, ее детоксикационную функцию, способствует сохранению и восстановлению структуры гепатоцитов; тормозит формирование соединительной ткани в печени.

Альфа-токоферола ацетат (витамин E) обладает антиоксидантными свойствами, обеспечивает защиту ненасыщенных жирных кислот в мембранах от липопероксидации; участвует в формировании межклеточного вещества, коллагеновых и эластических волокон соединительной ткани, гладкой мускулатуры сосудов, пищеварительного тракта.

Тиамин мононитрат (витамин B1) - необходимый фактор для передачи нервного импульса во всех тканях и самой центральной нервной системе (ЦНС), в качестве коэнзима участвует в углеводном обмене.

Рибофлавин (витамин B2) - катализатор процессов клеточного дыхания и перекисного окисления эндогенных веществ и ксенобиотиков, глюкуронирования.

Пиридоксин гидрохлорид (витамин B6) в качестве коэнзима принимает участие в метаболизме аминокислот и белков, в синтезе нейромедиаторов.

Никотинамид стабилизирует процессы тканевого дыхания, жирового и углеводного обмена, систему метаболизма ксенобиотиков.

Цианокобаламин (витамин B12) вместе с фолиевой кислотой участвует в синтезе нуклеотидов, в формировании эритроцитов и клеток нервных оболочек, необходим для роста организма.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

В составе комплексной терапии: хронические гепатиты, цирроз, жировая дегенерация печени различной этиологии (в том числе при сахарном диабете), токсическое поражение печени (алкогольные, лекарственные); псориаз.

В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Детский возраст до 18 лет.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

Перед применением препарата Ливолин Форте, если Вы беременны, или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом.

В период грудного вскармливания перед применением препарата Ливолин Форте необходимо проконсультироваться с врачом.

Клинические испытания у беременных и в период грудного вскармливания не проводились. Применение препарата во время беременности возможно только по рекомендации врача, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

При необходимости приема препарата во время лактации рекомендуется решить вопрос о прекращении кормления грудью.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

В составе комплексной терапии: хронические гепатиты, цирроз, жировая дегенерация печени различной этиологии (в том числе при сахарном диабете), токсическое поражение печени (алкогольные, лекарственные) - внутрь, по 1-2 капсулы 2-3 раза в день во время еды с небольшим количеством воды. Курс лечения – 3 месяца, при необходимости может быть продолжен или повторен после консультации с врачом.

При псориазе по 1 капсуле 3 раза в день. Курс лечения – 1-3 месяца (в составе комбинированной терапии).

Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Аллергические реакции (зуд, крапивница), тошнота, боли в животе.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Возможная передозировка может привести к симптомам дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, боли в животе, диарея).

Лечение симптоматическое.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Слабительные лекарственные средства, в состав которых входит минеральное масло, и колестирамин снижают усвоение альфа-токоферола ацетата (витамин Е). Бигуаниды уменьшают всасывание цианокобаламина (витамин В12).

Фторурацил, винбластин, блеомицин, цисплатин нарушают усвоение тиамина мононитрата (витамин В1), пиридоксина гидрохлорида (витамин В6); пеницилламин, изониазид снижают эффективность тиамина мононитрата (витамин В1), увеличивая его выведение.

Изониазид снижает эффективность пиридоксина гидрохлорида (витамин В6).

Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) повышает декарбоксилирование леводопы в периферических тканях.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

При использовании в высоких дозах моча окрашивается в ярко-желтый цвет (вследствие присутствия в составе препарата рибофлавина (витамин В2)).

В состав препарата входит воск пчелиный белый, это необходимо иметь в виду пациентам с непереносимостью продуктов пчеловодства.

ФОРМА ВЫПУСКА

Капсулы. По 10 капсул в блистер из ПВХ/алюминия. По 3 блистера с картонным вкладышем в запечатанном алюминиевом пакете вместе с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата помещают в картонную пачку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года.

Не использовать после истечения срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА

Отпускают без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА

Мега Лайфсайдсиз Паблик Компани Лимитед

Таиланд, 10280, Самутпракарн, Бангпу Индастриал Эстейт, Паттана 3 Род, 384 ул. 6

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР/ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ

АО «Мединторг»

123103, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д.74, корп. 2.

Тел.: +7 (495) 921-25-15 (многоканальный)

Руководитель отдела клинических
испытаний и регистрации
лекарственных средств



Власов Т.Ю.

