МИНЗДРАВ РОССИИ
№ N011302/01-060917
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата
Ревалид-Тева

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Ревалид-Тева

Лекарственная форма: капсулы

Состав

Действующие вещества:

DL-метионин	100 мг
L-цистин	50 мг
Кальция пантотенат	50 мг
Тиамина гидрохлорид	1,5 мг
Пиридоксина гидрохлорид	10 мг
П-аминобензойная кислота	20 мг
Микроэлементы в хелатокомплексе:	65 мг
Железо	2 мг
Цинк	2 мг
Медь	0,5 мг
Экстракт проса	50 мг
Экстракт зародышей пшеницы	50 мг
Дрожжи	50 мг

Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный 4,5 мг; *оболочка капсул*: желатин 98,0 мг, индигокармин (Е 132) 0,05 мг, хинолиновый желтый (Е 104) 0,11 мг.

Описание

Твердые желатиновые капсулы № 0, крышечка - прозрачная темно-зеленого цвета, корпус - прозрачный светло-зеленого цвета. Содержимое капсулы: порошок от коричневато-желтоватого до желтовато-коричневого цвета с более светлыми и более темными включениями, с характерным запахом.

Фармакологическая группа: поливитамины + прочие препараты

Код АТХ: A11AB

Фармакологические свойства

Компоненты препарата способствуют нормализации метаболических процессов.

Показания к применению

Препарат применяется при заболеваниях, сопровождающихся нарушением структуры волос и ногтей, и выпадением волос и способствует:

- улучшению поверхностной структуры и внешнего вида волос и уменьшению их ломкости;
- улучшению трофики волосяных луковиц и ногтей;
- повышению устойчивости и замедлению выпадения волос в результате воздействия неблагоприятных факторов внешней среды и нежелательных воздействий (механические повреждения; воздействие химической природы - окраска волос; воздействие рентгеновских и ультрафиолетовых лучей).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Прием препарата Ревалид-Тева в период беременности и в период грудного вскармливания возможен только после тщательной оценки соотношения пользы для матери и возможного риска для плода или новорожденного.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет - по 1 капсуле 3 раза в день во время еды или после приема пищи.

Курс лечения - 3 месяца. По рекомендации врача, при необходимости, терапия препаратом может быть продлена или проведена повторно.

В особо тяжелых случаях (при интенсивном или диффузном выпадении волос) предлагается усиленный курс лечения: по 2 капсулы 3 раза в день в течение первого месяца, а затем можно перейти на обычный курс лечения: по 1 капсуле 3 раза в день по рекомендации врача.

Дети младше 12 лет - не рекомендуется применение препарата детям младше 12 лет в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности.

Побочное действие

Нежелательные эффекты классифицированы в соответствии с их частотой развития следующим образом: очень часто (≥ 1/10), часто (≥1/100, но <1/10), нечасто (≥1/1000, но

<1/100), редко (≥1/10000, но <1/1000) и очень редко (<1/10000); частота неизвестна (частоту возникновения явлений нельзя определить на основании имеющихся данных).

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: частота неизвестна: дискомфорт в эпигастральной области, тошнота, боль в животе.

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата. При дозировке 6 капсул в день могут появляться незначительные нарушения в пищеварении, в этом случае следует сократить дозу до 3 капсул в день.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При одновременном применении с сульфаниламидами терапию препаратом Ревалид-Тева следует прекратить (действие сульфаниламидов ингибируется парааминобензойной кислотой).

Не следует принимать одновременно препарат Ревалид-Тева и допаминэргические средства, такие как леводопа. Препарат Ревалид-Тева может мешать всасыванию и метаболизму препаратов, содержащих леводопу, и, следовательно, снижать их эффективность.

Особые указания

В случае приема препарата в промежутке между приемами пищи или на голодный желудок может наблюдаться тошнота или легкий дискомфорт в эпигастральной области. Поэтому необходимо строго следовать рекомендуемым способам приема. При приеме 6 капсул в день могут наблюдаться легкие расстройства пищеварения. В данном случае рекомендуется снижение дозы до 3 капсул в день.

Информация для пациентов, страдающих сахарным диабетом: 1 капсула = 0,033 хлебных единиц (ХЕ) (6,7 кДж/1,6 ккал).

Информация для пациентов, страдающих целиакией: 1 капсула содержит 1 мг глютена.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Применение препарата не оказывает значимого влияния на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Форма выпуска

Капсулы. По 10 капсул в блистере из ПВХ/ПЕ/ПВДХ/Ал. фольги. По 3 или 9 блистеров вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

Хранить при температуре 15–25°С в сухом месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Юридическое лицо, на имя которого выдано РУ:

Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль

Производитель: Фармацевтический завод Тева Прайвэт Ко. Лтд.,

ул. Паллаги 13, H-4042 Дебрецен, Венгрия

Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «Тева», 115054, Москва, ул. Валовая, 35,

тел.: +7 (495) 644 22 34, факс: +7 (495) 644 22 35/36

Представитель компании 

А.С. Карас