

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Лавасепт

**концентрат для приготовления раствора для наружного и
местного применения 20 %**

Б.Браун Медикал АГ, Швейцария

Изменение № 2


Дата внесения Изменения « ____ » 16 11 12 201_ г.

Старая редакция	Новая редакция
Противопоказания Гиперчувствительность к компонентам препарата. Операции на головном мозге, глазах, среднем и внутреннем ухе. Промывание неинфицированных суставов и хрящей. Беременность, период грудного вскармливания. Детский возраст (до 18 лет). С осторожностью При операциях на неповрежденных хрящевых тканях. Раствор Лавасепта может применяться для промывания брюшной и плевральной полости (перитонит, интраоперационное инфицирование брюшной полости, острая и хроническая эмпиема плевры, интраоперационное инфицирование плевральной полости) только после тщательной оценки соотношения риск/польза, оценки функционального состояния выделительной функции почек.	Противопоказания Гиперчувствительность к компонентам препарата. Операции на головном мозге, глазах, среднем и внутреннем ухе. Промывание неинфицированных суставов и хрящей. Промывание брюшной и плевральной полостей. Беременность, период грудного вскармливания. Детский возраст (до 18 лет). С осторожностью При операциях на неповрежденных хрящевых тканях.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Наружно и местно. Лавасепт можно использовать только разведенным в концентрации 0,1% или 0,2%. <u>Приготовление 0,1% раствора Лавасепта (0,02% раствора полигексанида)</u> К 1000 мл раствора Рингера без лактата или 0,9% раствора натрия хлорида шприцом добавляют 1,0 мл концентрата. <u>Приготовление 0,2% раствора Лавасепта (0,04% раствора полигексанида)</u> К 1000 мл раствора Рингера без лактата или 0,9% раствора натрия хлорида шприцом добавляют 2,0 мл концентрата. 2 метода приготовления раствора из концентрата: - необходимое количество концентрата стерильным шприцом вводят в бутылку со стерильным растворителем и перемешивают; - необходимое количество концентрата смешивают с растворителем, разливают в подходящие емкости и стерилизуют (при температуре 121 °С в течение 15 мин). Разведенный Лавасепт применяют для промывания ран, в том числе с использованием дренажа, а также в виде марлевых салфеток, обильно смоченных раствором. В начале обработки поверхностных гнойных ран, инфицированных грамотрицательной микрофлорой обычно применяют 0,2% раствор Лавасепта. Для последующей обработки ран, их активного промывания используют 0,1% раствор препарата. Для промывания брюшной и плевральной полости используется 0,1% раствор Лавасепта. С целью предупреждения скопления препарата в полостях рекомендуется использовать аспирационные устройства. <u>Продолжительность применения</u> Ограничений по продолжительности использования препарата не выявлено.	Способ применения и дозы Наружно и местно. Лавасепт можно использовать только разведенным в концентрации 0,1% или 0,2%. <u>Приготовление 0,1% раствора Лавасепта (0,02% раствора полигексанида)</u> К 1000 мл раствора Рингера без лактата или 0,9% раствора натрия хлорида шприцом добавляют 1,0 мл концентрата. <u>Приготовление 0,2% раствора Лавасепта (0,04% раствора полигексанида)</u> К 1000 мл раствора Рингера без лактата или 0,9% раствора натрия хлорида шприцом добавляют 2,0 мл концентрата. 2 метода приготовления раствора из концентрата: - необходимое количество концентрата стерильным шприцом вводят в емкость со стерильным растворителем и перемешивают; - необходимое количество концентрата смешивают с растворителем, разливают в подходящие емкости и стерилизуют (при температуре 121 °С в течение 15 мин). Разведенный Лавасепт применяют для промывания ран, в том числе с использованием дренажа, а также в виде марлевых салфеток, обильно смоченных раствором. В начале обработки поверхностных гнойных ран, инфицированных грамотрицательной микрофлорой обычно применяют 0,2% раствор Лавасепта. Для последующей обработки ран, их активного промывания используют 0,1% раствор препарата. <u>Продолжительность применения</u> Ограничений по продолжительности использования препарата не выявлено.

Представитель фирмы
Б. Браун Медикал АГ,
к.ф.н.

Околелова М.С.



75723