

Гипоксен®

H. B. Sumner

Устранение гипоксии, развивающейся в экстремальных условиях: гиповентиляция легких, высокогорье, подводные работы, работа в условиях повышенной температуры, занятия спортом: 1 суточная доза за 30-60 минут перед нагрузкой.

Длительная напряженная умственная деятельность, хроническая усталость, сокращение восстановительного периода после перенесенных чрезмерных физических нагрузок, травм, оперативных вмешательств: $\frac{1}{2}$ суточной дозы 2 раза в день в течение 2-3 недель. Курсы можно повторять с перерывом на 1-2 недели.

Комплексное лечение пневмонии: $\frac{1}{2}$ суточной дозы 2 раза в день, курс 14 дней.

Комплексное лечение обструктивного бронхита: по $\frac{1}{2}$ суточной дозы 2 раза в день – 2 курса по 14 дней с интервалом 7 дней.

Комплексное лечение бронхиальной астмы: $\frac{1}{2}$ суточной дозы 2 раза в день; курсы по 21-30 дней с интервалом 10 дней.

Комплексная профилактика стабильной стенокардии: $\frac{1}{2}$ суточной дозы 2 раза в день, курс 15-30 дней с интервалом 10 дней.

Комплексное лечение гипертонической болезни: $\frac{1}{2}$ суточной дозы 2 раза в день, курс 10 дней.

Комплексное лечение сердечной недостаточности: $\frac{1}{2}$ суточной дозы 2 раза в день, курс 10-14 дней.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Индивидуальная непереносимость препарата, аллергические реакции.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Симптомы: сухость во рту, тошнота и ощущение дискомфорта в животе, в редких случаях - угнетение дыхания. Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Отрицательных фармацевтических, фармакодинамических и фармакокинетических взаимодействий с другими лекарственными средствами не установлено.

Несовместимости препарата с другими лекарственными средствами не выявлено.

ФОРМА ВЫПУСКА

Капсулы 250 мг. По 30 капсул в банках полимерных и флаконах полимерных. Банка или флакон вместе с инструкцией в пачке картона коробочного или хром – эрзац.

По 10 капсул в упаковку ячейковую контурную. По 2 или 3 контурные упаковки вместе с инструкцией в пачке из картона коробочного или хром-эрзац.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ: 4 года. Не использовать по окончании срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК: Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН», 127299, г.Москва, ул. Клары Цеткин, д.18, стр.1 тел./факс (495) 153-32-48.

Претензии потребителей направлять по адресу: 127299, г.Москва, ул. Клары Цеткин, д.18, стр.1 тел./факс (495) 153-32-48.

И.О.Директора ИДКЭЛС

Генеральный директор
ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН»
Академик ЕАЕН

Васильев А.Н.

Кузьмич М.К.

ОЛИФЕН
OLIFEN Corp.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ ДОКЛИНИЧЕСКОЙ
И КЛИНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ
И МЕДИЦИНСКИХ
ПРОДУКТОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
М.О. МОСКВА
УЛ. КЛАРЫ ЦЕТКИН, Д. 18, СТ. 1
127299