

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

ПОЛЫНИ НАСТОЙКА

Регистрационный номер

Торговое наименование

Полыни настойка

Международное непатентованное или группировочное наименование

Полыни горькой травы настойка

Лекарственная форма

Настойка

Состав

Для получения 1000 мл настойки используют:

Действующие вещества:

Полыни горькой травы

- 200 г;

Вспомогательные вещества:

Этанола (спирта этилового) 70 %

- достаточное количество для
получения 1000 мл.

Описание

Прозрачная жидкость зеленовато-коричневого цвета характерного запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, стимулирующие аппетит.

Код АТХ A15

Фармакологические свойства

Основными действующими веществами являются арсумин (сумма лактонов) и абсинтин (индивидуальный лактон). Раздражая вкусовые рецепторы слизистых оболочек рта и языка, полыни настойка вызывает рефлексным путем усиление секреции желудочного сока, повышение аппетита, улучшение пищеварения. Оказывает противовоспалительное, желчегонное и противомикробное действие.

Показания к применению

Анорексия, гипо- и анацидный гастрит, хронический холецистит, дискинезия желчевыводящих путей по гипомоторному типу.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, повышенная желудочная секреция, гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагит, острый холецистит, детский возраст до 12 лет, беременность, период грудного вскармливания.

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, детский возраст старше 12 лет, эпилепсия.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь по 15-20 капель, разведенных в $\frac{1}{4}$ стакана воды, 2-3 раза в день за 20-30 минут до еды. Курс лечения 20-25 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. При длительном применении - изжога, гастралгия, диарея, тошнота, рвота.

Если любые из указанных в инструкции нежелательных реакций усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: тремор, головная боль, головокружение, судороги.

Лечение – симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

В максимальной суточной дозе содержится 0,66 г абсолютного этилового спирта, в максимальной разовой дозе – 0,22 г абсолютного этилового спирта.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период применения препарата следует воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Настойка. По 25 мл во флаконах/флаконах-капельницах оранжевого стекла, укупоренных пробками пластмассовыми и крышками навинчиваемыми пластмассовыми с защитой или без защиты от детей, с контролем первого вскрытия или без контроля первого вскрытия.

Каждый флакон/флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Упаковка для стационаров. По 18 кг в канистрах полимерных с навинчиваемыми крышками с предохранительным кольцом.

Канистры дополнительно снабжают инструкциями по применению (наклеивают или вкладывают в специальный кармашек).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей

Закрытое акционерное общество «Ярославская фармацевтическая фабрика»
Россия, 150030, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5,
тел. (4852) 44-38-56

Директор ЗАО «ЯФФ»



С.П. Атмашкин