

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ВУЛНУЗАН®

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: ВУЛНУЗАН®

МИНЗДРАВ РОССИИ И
П/№ 008924- 090615
СОГЛАСОВАНО

МНН или группировочное название: Поморийского озера маточный щелок
(Стабилизированный щелок "Солилуг")

Лекарственная форма: мазь для местного и наружного применения

Состав:

Название компонентов	Содержание, г	
	в 100 г	в 45 г
<i>Активное вещество</i>		
Поморийского озера маточный щелок (Стабилизированный щелок "Солилуг")	12,000	5,400
<i>Вспомогательные вещества</i>		
Клещевины обыкновенной семян масло (Касторовое масло)	20,000	9,000
Кармеллоза натрия	3,000	1,350
Ланолин	32,000	14,400
Натрия бензоат	0,500	0,225
Очищенная вода	32,500	14,625

Описание: Однородная мазь от светло-желтого до желтого цвета со специфическим запахом

Фармакотерапевтическая группа

Противовоспалительное средство природного происхождения для местного применения.

Код АТХ: D11AX

Фармакологические свойства

Фармакодинамика. Препарат природного происхождения из щелочи Поморийского озера содержит ряд важных для организма человека макро- и микроэлементов – хлорида и сульфата магния, хлорида натрия, калия, кальция, железа, хлора, брома, селена, молибдена, меди, марганца, цинка, йода, висмута, силиция, титана, арсена, бериллия, сульфата алюминия, коллоидные вещества, кислоты и другие органические соединения. Оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие, угнетая патогенную бактериальную флору, стимулирует

иммунобиологические защитные реакции – фагоцитоз и образование антител, стимулирует регенерацию тканей и эпителизацию раневых поверхностей.

Показания к применению

В комплексном лечении гнойных ран различного происхождения: инфицированные, хирургические поверхностные гнойные процессы, в том числе параректальные и постинъекционные абсцессы, трофические язвы, посттравматические и атеросклеротические раны, медикаментозная мацерация кожи, изъязвления кожи при болезни Бюргера, варикозные язвы, эрозия шейки матки, трещины соска молочной железы.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, детский возраст (до 12 лет).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности противопоказано.

В период грудного вскармливания препарат можно применять в рекомендованных дозах. Необходима консультация врача.

Способ применения и дозы

Местно, наружно.

Мазь наносят непосредственно на рану или на марлю в количестве, достаточном для покрытия раневой поверхности, слоем толщиной 2 – 3 мм.

Разовая доза – не более 10 – 15 г мази (при глубоких абсцессах). В начале лечения наносят мазь ежедневно, при стихании воспалительного процесса и появлении грануляционной ткани – через день. При лечении трещин соска молочной железы мазь наносят несколько раз в день после кормления ребенка. Перед началом следующего кормления препарат тщательно смывают теплой кипяченой водой. При лечении эрозии шейки матки используют тампон с нанесенным на него препаратом, который вводят один раз в день, предпочтительно вечером, в течение 10 -15 дней.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции в виде кожной сыпи, крапивницы, ангионевротического отека. Возможно возникновение боли в месте нанесения препарата у пациентов с варикозными язвами и поражением кожи при болезни Бюргера.

Передозировка

Случаев передозировки при применении препарата не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

- При необходимости можно применять окклюзионные повязки.
- Лекарственный препарат содержит ланолин, который может вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).
- Клешевины обыкновенной семян масло (касторовое масло) при местном применении может вызвать кожные реакции.

- Натрия бензоат может вызвать слабое раздражение при попадании в глаза и на слизистые оболочки, а так же может вызвать слабое раздражение кожи.
- Применение препарата не влияет на способность к управлению транспортными средствами и занятию потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Мазь для местного и наружного применения.

По 45 г препарата в алюминиевую тубу. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25° С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

2 года.

Срок годности после вскрытия тубы: 1 месяц.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель

АО "СОФАРМА", Болгария, 1220 София, ул. Илиенское шоссе № 16


тел.: (+3592) 813 42 00, факс: (+3592) 936 02 86

Претензии потребителей и информацию о нежелательных явлениях следует направлять по адресу:

Представительство АО "СОФАРМА"

1091474, Москва, ул. Таганская д 17-23, эт. 10 тел./факс: (495) 799 55 11

Представитель фирмы



Засосова И.М.