

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

БИЛЬТРИЦИД® / BILTRICIDE®

Таблетки покрытые плёночной оболочкой, 600 мг

«Байер Фарма АГ», Германия

Изменение № 5



Дата внесения Изменения «___» 181017 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ • Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата; • цистицеркоз глаз; • сочетанное применение с сильными индукторами цитохрома Р450, такими как рифампицин; • детский возраст до 4 лет (безопасность и эффективность не установлены).	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ • Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата; • цистицеркоз глаз; • сочетанное применение с мощными индукторами цитохрома Р450, такими как рифампицин; • детский возраст до 4 лет (безопасность и эффективность не установлены).
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ При одновременном применении с препаратами, индуцирующими ферменты печени системы цитохрома Р450, например, с противосудорожными средствами, дексаметазоном концентрация празиквантела в плазме крови может снижаться, а при сочетании с препаратами, ингибирующими эти ферменты, например, с циметидином – повышаться.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ При одновременном применении с препаратами, индуцирующими ферменты печени системы цитохрома Р450, например, с противосудорожными средствами, дексаметазоном концентрация празиквантела в плазме крови может снижаться, а при сочетании с препаратами, ингибирующими эти ферменты, например, с циметидином, кетоконазолом, итраконазолом и эритромицином – повышаться.

Старая редакция	Новая редакция
Следует избегать одновременного применения препарата с мощными ингибиторами цитохрома Р450, например, рифампицином, так как он может препятствовать достижению терапевтических концентраций празиквантела в плазме крови.	Необходимо избегать одновременного применения препарата с мощными индукторами цитохрома Р450, например, рифампицином, так как он может препятствовать достижению терапевтических концентраций празиквантела в плазме крови. При одновременном приеме с грейпфрутовым соком в клинических исследованиях наблюдалось увеличение экспозиции празиквантела менее чем в два раза.

Руководитель по управлению
регуляторной политикой АО «БАЙЕР»

Сычева Е.И.



105408