МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-003333- 071118
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Прегабио®

Pregabio®

наименование лекарственного препарата

капсулы, 25 мг, 50 мг, 75 мг, 100 мг, 150 мг, 200 мг, 225 мг, 300 мг

лекарственная форма, дозировка

АО «КРКА, д.д., Ново место», Словения

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 071118 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав	**Состав**
на 1 капсулу 25 мг:	**1 капсула 25 мг содержит:**
Действующее вещество:	***Действующее вещество:***
Прегабалин 25,00 мг	Прегабалин 25,00 мг
Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный прежелатинизированный, тальк	***Вспомогательные вещества:*** крахмал кукурузный прежелатинизированный, тальк
Состав твердых желатиновых капсул № 4:	**Состав твердых желатиновых капсул № 4:**
Корпус: титана диоксид (Е171), желатин	*Корпус:* титана диоксид (Е171), желатин
Крышечка: титана диоксид (Е171), желатин	*Крышечка:* титана диоксид (Е171), желатин
на 1 капсулу 50 мг:	**1 капсула 50 мг содержит:**
Действующее вещество:	***Действующее вещество:***
Прегабалин 50,00 мг	Прегабалин 50,00 мг
Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный прежелатинизированный, тальк	***Вспомогательные вещества:*** крахмал кукурузный прежелатинизированный, тальк
Состав твердых желатиновых капсул № 3:	**Состав твердых желатиновых капсул № 3:**

Корпус: титана диоксид (Е171), желатин *Крышечка:* титана диоксид (Е171), желатин, краситель железа оксид желтый (Е172)	*Корпус:* титана диоксид (Е171), желатин *Крышечка:* титана диоксид (Е171), желатин, краситель железа оксид желтый (Е172)
на 1 капсулу 75 мг: Действующее вещество: Прегабалин 75,00 мг Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный прежелатинизированный, тальк	**1 капсула 75 мг содержит:** ***Действующее вещество:*** Прегабалин 75,00 мг ***Вспомогательные вещества:*** крахмал кукурузный прежелатинизированный, тальк
Состав твердых желатиновых капсул № 4: *Корпус:* титана диоксид (Е171), желатин, краситель железа оксид желтый (Е172) *Крышечка:* титана диоксид (Е171), желатин, краситель железа оксид желтый (Е172)	**Состав твердых желатиновых капсул № 4:** *Корпус:* титана диоксид (Е171), желатин, краситель железа оксид желтый (Е172) *Крышечка:* титана диоксид (Е171), желатин, краситель железа оксид желтый (Е172)
на 1 капсулу 100 мг: Действующее вещество: Прегабалин 100,00 мг Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный прежелатинизированный, тальк	**1 капсула 100 мг содержит:** ***Действующее вещество:*** Прегабалин 100,00 мг ***Вспомогательные вещества:*** крахмал кукурузный прежелатинизированный, тальк
Состав твердых желатиновых капсул № 3: *Корпус:* титана диоксид (Е171), желатин, краситель железа оксид красный (Е172) *Крышечка:* титана диоксид (Е171), желатин, краситель железа оксид красный (Е172)	**Состав твердых желатиновых капсул № 3:** *Корпус:* титана диоксид (Е171), желатин, краситель железа оксид красный (Е172) *Крышечка:* титана диоксид (Е171), желатин, краситель железа оксид красный (Е172)
на 1 капсулу 150 мг: Действующее вещество: Прегабалин 150,00 мг Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный прежелатинизированный, тальк	**1 капсула 150 мг содержит:** ***Действующее вещество:*** Прегабалин 150,00 мг ***Вспомогательные вещества:*** крахмал кукурузный прежелатинизированный, тальк
Состав твердых желатиновых капсул № 2: *Корпус:* титана диоксид (Е171), желатин	**Состав твердых желатиновых капсул № 2:** *Корпус:* титана диоксид (Е171), желатин

Крышечка: титана диоксид (Е171), желатин, краситель железа оксид желтый (Е172), краситель железа оксид красный (Е172)	*Крышечка:* титана диоксид (Е171), желатин, краситель железа оксид желтый (Е172), краситель железа оксид красный (Е172)
на 1 капсулу 200 мг:	**1 капсула 200 мг содержит:**
Действующее вещество:	***Действующее вещество:***
Прегабалин 200,00 мг	Прегабалин 200,00 мг
Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный прежелатинизированный, тальк	***Вспомогательные вещества:*** крахмал кукурузный прежелатинизированный, тальк
Состав твердых желатиновых капсул № 1:	**Состав твердых желатиновых капсул № 1:**
Корпус: титана диоксид (Е171), желатин, краситель железа оксид желтый (Е172), краситель железа оксид красный (Е172), краситель железа оксид черный (Е172)	*Корпус:* титана диоксид (Е171), желатин, краситель железа оксид желтый (Е172), краситель железа оксид красный (Е172), краситель железа оксид черный (Е172)
Крышечка: титана диоксид (Е171), желатин, краситель железа оксид желтый (Е172), краситель железа оксид красный (Е172), краситель железа оксид черный (Е172)	*Крышечка:* титана диоксид (Е171), желатин, краситель железа оксид желтый (Е172), краситель железа оксид красный (Е172), краситель железа оксид черный (Е172)
на 1 капсулу 225 мг:	**1 капсула 225 мг содержит:**
Действующее вещество:	***Действующее вещество:***
Прегабалин 225,00 мг	Прегабалин 225,00 мг
Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный прежелатинизированный, тальк	***Вспомогательные вещества:*** крахмал кукурузный прежелатинизированный, тальк
Состав твердых желатиновых капсул № 1:	**Состав твердых желатиновых капсул № 1:**
Корпус: титана диоксид (Е171), желатин	*Корпус:* титана диоксид (Е171), желатин
Крышечка: титана диоксид (Е171), желатин, краситель железа оксид желтый (Е172), краситель железа оксид красный (Е172), краситель железа оксид черный (Е172)	*Крышечка:* титана диоксид (Е171), желатин, краситель железа оксид желтый (Е172), краситель железа оксид красный (Е172), краситель железа оксид черный (Е172)
на 1 капсулу 300 мг:	**1 капсула 300 мг содержит:**
Действующее вещество:	***Действующее вещество:***
Прегабалин 300,00 мг	Прегабалин 300,00 мг

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный прежелатинизированный, тальк	***Вспомогательные вещества:*** крахмал кукурузный прежелатинизированный, тальк
Состав твердых желатиновых капсул № 0:	**Состав твердых желатиновых капсул № 0:**
Корпус: титана диоксид (Е171), желатин	*Корпус:* титана диоксид (Е171), желатин
Крышечка: титана диоксид (Е171), желатин, краситель железа оксид желтый (Е172), краситель железа оксид красный (Е172), краситель железа оксид черный (Е172)	*Крышечка:* титана диоксид (Е171), желатин, краситель железа оксид желтый (Е172), краситель железа оксид красный (Е172), краситель железа оксид черный (Е172)
Состав черных чернил:	**Состав черных чернил:**
а) Раствор глазури шеллака в этаноле, краситель железа оксид черный (Е172), бутанол, вода очищенная, пропиленгликоль (Е1520), этанол безводный, 2-пропанол, аммиак водный (Е527).	а) Раствор глазури шеллака в этаноле, краситель железа оксид черный (Е172), бутанол, вода очищенная, пропиленгликоль (Е1520), этанол безводный, 2-пропанол, аммиак водный (Е527).
Или	Или
б) Шеллак, этанол безводный, 2-пропанол, бутанол, пропиленгликоль, аммиака раствор концентрированный, краситель железа оксид черный (Е172), калия гидроксид, вода очищенная.	б) Шеллак, этанол безводный, 2-пропанол, бутанол, пропиленгликоль, аммиака раствор концентрированный, краситель железа оксид черный (Е172), калия гидроксид, вода очищенная.
Состав белых чернил:	**Состав белых чернил:**
Шеллак, этанол безводный, 2-пропанол, бутанол, пропиленгликоль, аммиака раствор концентрированный, вода очищенная, калия гидроксид, титана диоксид (Е171).	Шеллак, этанол безводный, 2-пропанол, бутанол, пропиленгликоль, аммиака раствор концентрированный, вода очищенная, калия гидроксид, титана диоксид (Е171).
Побочное действие	**Побочное действие**
На основании опыта клинического применения прегабалина у более чем 12000 пациентов, наиболее распространенными нежелательными явлениями (НЯ) были головокружение и сонливость. Наблюдаемые	На основании опыта клинического применения прегабалина у более чем 12000 пациентов, наиболее распространенными нежелательными явлениями (НЯ) были головокружение и сонливость. Наблюдаемые

НЯ были обычно легкими или умеренными. Частота отмены прегабалина и плацебо вследствие НЯ составила 14 % и 7 %, соответственно. Основными НЯ, требовавшими прекращения лечения, были головокружение (4 %) и сонливость (3 %), в зависимости от их субъективной переносимости. Другие побочные эффекты, также приводящие к отмене препарата: атаксия, спутанность сознания, астения, нарушение внимания, нечеткость зрения, нарушение координации, периферические отеки. Также отмечались НЯ, возникающие после отмены прегабалина: бессонница, головная боль, тошнота, тревога, гриппоподобный синдром, судороги, повышенная возбудимость, депрессия, боль, гипергидроз и диарея. На фоне терапии центральной нейропатической боли, связанной с повреждением спинного мозга, наблюдается увеличение частоты побочных реакций в целом, а также побочных реакций со стороны ЦНС, в особенности сонливости. Ниже перечислены все НЯ, частота которых превышала таковую в группе плацебо (наблюдавшиеся более чем у 1 человека). Они распределены по системно-органным классам и частоте.	НЯ были обычно легкими или умеренными. Частота отмены прегабалина и плацебо вследствие НЯ составила 14 % и 7 %, соответственно. Основными НЯ, требовавшими прекращения лечения, были головокружение (4 %) и сонливость (3 %), в зависимости от их субъективной переносимости. Другие побочные эффекты, также приводящие к отмене препарата: атаксия, спутанность сознания, астения, нарушение внимания, нечеткость зрения, нарушение координации, периферические отеки. Также отмечались НЯ, возникающие после отмены прегабалина: бессонница, головная боль, тошнота, тревога, гриппоподобный синдром, судороги, повышенная возбудимость, депрессия, боль, гипергидроз и диарея. На фоне терапии центральной нейропатической боли, связанной с повреждением спинного мозга, наблюдается увеличение частоты побочных реакций в целом, а также побочных реакций со стороны ЦНС, в особенности сонливости. Ниже перечислены все НЯ, частота которых превышала таковую в группе плацебо (наблюдавшиеся более чем у 1 человека). Они распределены по системно-органным классам и частоте.

Классификация частоты развития побочных эффектов, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): очень часто ≥ 1/10 часто от ≥ 1/100 до < 1/10 нечасто от ≥ 1/1000 до < 1/100 редко от ≥ 1/10000 до < 1/1000 очень редко < 1/10000 частота неизвестна не может быть оценена на основе имеющихся данных. Реакции, наблюдавшиеся во время пострегистрационного применения прегабалина, выделены курсивом. Перечисленные НЯ могли быть связаны с основным заболеванием и/или сопутствующей терапией. *Инфекционные и паразитарные заболевания:* часто: назофарингит. *Нарушения со стороны крови и лимфатической системы:* нечасто: нейтропения. *Нарушения со стороны обмена веществ и питания:* часто: повышение аппетита; нечасто: анорексия, гипогликемия. *Нарушения психики:* часто: эйфория, спутанность сознания, бессонница, раздражительность, депрессия,	Классификация частоты развития побочных эффектов, рекомендуем**ая** Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): очень часто ≥ 1/10 часто от ≥ 1/100 до < 1/10 нечасто от ≥ 1/1000 до < 1/100 редко от ≥ 1/10000 до < 1/1000 очень редко < 1/10000 частота неизвестна не может быть оценена на основе имеющихся данных. Реакции, наблюдавшиеся во время пострегистрационного применения прегабалина, выделены курсивом. Перечисленные НЯ могли быть связаны с основным заболеванием и/или сопутствующей терапией. *Инфекционные и паразитарные заболевания:* часто: назофарингит. *Нарушения со стороны крови и лимфатической системы:* нечасто: нейтропения. *Нарушения со стороны обмена веществ и питания:* часто: повышение аппетита; нечасто: анорексия, гипогликемия. *Нарушения психики:* часто: эйфория, спутанность сознания, бессонница, раздражительность, депрессия, дезориентация, снижение либидо, паническая атака, апатия; нечасто: галлюцинации, беспокойство, тревожное возбуждение, подавленное

дезориентация, снижение либидо, паническая атака, апатия; нечасто: галлюцинации, беспокойство, тревожное возбуждение, подавленное настроение, приподнятое настроение, лабильность настроения, агрессивность, деперсонализация, тревожные сновидения, трудности в подборе слов, повышение либидо, аноргазмия, усиление бессонницы; редко: расторможенность. *Нарушения со стороны нервной системы:* очень часто: головокружение, сонливость, головная боль; часто: атаксия, нарушение координации, тремор, дизартрия, амнезия, ухудшение памяти, нарушение внимания, парестезия, гипестезия, седация, нарушение равновесия, летаргия, агевзия; нечасто: обморок, миоклония, психомоторное возбуждение, дискинезия, ортостатическое головокружение, интенционный тремор, нистагм, нарушение речи, ослабление рефлексов, ощущение жжения на слизистых оболочках и коже, гиперестезия, потеря сознания, когнитивные нарушения; редко: патологическое оцепенение, гипокинезия, паросмия, дисграфия, судороги. *Нарушения со стороны органа зрения:* часто: нечеткость зрения, диплопия; нечасто: утрата периферического зрения, нарушение зрения, отечность глаз, дефект поля зрения, снижение остроты зрения, боль в	настроение, приподнятое настроение, лабильность настроения, агрессивность, деперсонализация, тревожные сновидения, трудности в подборе слов, повышение либидо, аноргазмия, усиление бессонницы; редко: расторможенность. *Нарушения со стороны нервной системы:* очень часто: головокружение, сонливость, головная боль; часто: атаксия, нарушение координации, тремор, дизартрия, амнезия, ухудшение памяти, нарушение внимания, парестезия, гипестезия, седация, нарушение равновесия, летаргия, агевзия; нечасто: обморок, миоклония, психомоторное возбуждение, дискинезия, ортостатическое головокружение, интенционный тремор, нистагм, нарушение речи, ослабление рефлексов, ощущение жжения на слизистых оболочках и коже, гиперестезия, потеря сознания, когнитивные нарушения; редко: патологическое оцепенение, гипокинезия, паросмия, дисграфия, судороги. *Нарушения со стороны органа зрения:* часто: нечеткость зрения, диплопия; нечасто: утрата периферического зрения, нарушение зрения, отечность глаз, дефект поля зрения, снижение остроты зрения, боль в глазах, астенопия, сухость в глазах, повышенное слезотечение, раздражение слизистой оболочки глаз;

глазах, астенопия, сухость в глазах, повышенное слезотечение, раздражение слизистой оболочки глаз; редко: осциллопсия (субъективное ощущение колебания рассматриваемых предметов), нарушение восприятия зрительной глубины, мидриаз, косоглазие, усиление яркости зрительного восприятия, кератит, потеря зрения. *Нарушения со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата:* часто: вертиго; нечасто: гиперакузия. *Нарушения со стороны сердца:* нечасто: тахикардия, атриовентрикулярная блокада I степени, синусовая брадикардия, хроническая сердечная недостаточность (ХСН); редко: синусовая тахикардия, синусовая аритмия, удлинение интервала QT. *Нарушения со стороны сосудов:* нечасто: снижение артериального давления (АД), повышение АД, гиперемия кожи, «приливы», похолодание конечностей. *Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения:* часто: сухость слизистой оболочки полости носа; нечасто: одышка, кровотечение из носа, кашель, заложенность носа, ринит, храп;	редко: осциллопсия (субъективное ощущение колебания рассматриваемых предметов), нарушение восприятия зрительной глубины, мидриаз, косоглазие, усиление яркости зрительного восприятия, кератит, потеря зрения. *Нарушения со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата:* часто: вертиго; нечасто: гиперакузия. *Нарушения со стороны сердца:* нечасто: тахикардия, атриовентрикулярная блокада I степени, синусовая брадикардия, хроническая сердечная недостаточность (ХСН); редко: синусовая тахикардия, синусовая аритмия, удлинение интервала QT. *Нарушения со стороны сосудов:* нечасто: снижение артериального давления (АД), повышение АД, гиперемия кожи, «приливы», похолодание конечностей. *Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения:* часто: сухость слизистой оболочки полости носа; нечасто: одышка, кровотечение из носа, кашель, заложенность носа, ринит, храп; редко: чувство «стеснения» в глотке, отек легких. *Нарушения со стороны пищеварительной системы:*

редко: чувство «стеснения» в глотке, отек легких. *Нарушения со стороны пищеварительной системы:* часто: рвота, запор, метеоризм, вздутие живота, сухость слизистой оболочки полости рта, тошнота, диарея; нечасто: гастроэзофагеальный рефлюкс, повышенное слюноотделение, гипестезия слизистой оболочки полости рта; редко: асцит, дисфагия, панкреатит, отек языка. *Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей:* нечасто: повышенное потоотделение, папулезная сыпь, крапивница, отек лица, кожный зуд; редко: синдром Стивенса-Джонсона, холодный пот. *Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани:* часто: мышечные судороги, артралгия, боль в спине, боль в конечностях, спазм шейных мышц; нечасто: припухлость суставов, миалгия, подергивания мышц, боль в шее, скованность мышц; редко: рабдомиолиз. *Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей:* нечасто: дизурия, недержание мочи;	часто: рвота, запор, метеоризм, вздутие живота, сухость слизистой оболочки полости рта, тошнота, диарея; нечасто: гастроэзофагеальный рефлюкс, повышенное слюноотделение, гипестезия слизистой оболочки полости рта; редко: асцит, дисфагия, панкреатит, отек языка. ***Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей:*** **нечасто: повышение активности «печеночных» ферментов – аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) в плазме крови;** **редко: желтуха;** **очень редко: печеночная недостаточность, гепатит.** Нарушения *со стороны кожи и подкожных тканей:* нечасто: повышенное потоотделение, папулезная сыпь, крапивница, отек лица, кожный зуд; редко: синдром Стивенса-Джонсона, холодный пот. *Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани:* часто: мышечные судороги, артралгия, боль в спине, боль в конечностях, спазм шейных мышц;

редко: почечная недостаточность, олигурия, задержка мочи. *Нарушения со стороны половых органов и молочной железы:* часто: боль в области молочных желез, эректильная дисфункция; нечасто: задержка эякуляции, сексуальная дисфункция, дисменорея; редко: аменорея, выделения из молочных желез, увеличение молочных желез в объеме, гинекомастия. *Общие расстройства и нарушения в месте введения:* часто: отеки, в том числе периферические, нарушение походки, падения, чувство «опьянения», плохое самочувствие, утомляемость; нечасто: генерализованный отек, чувство «стеснения» в груди, боль, гипертермия, жажда, озноб, астения, недомогание; *Лабораторные и инструментальные данные:* часто: увеличение массы тела, повышение концентрации креатинина в плазме крови; нечасто: повышение активности, аланинаминотрансферазы, креатинфосфокиназы, аспартатаминотрансферазы, повышение концентрации глюкозы в крови, снижение количества тромбоцитов в крови, снижение содержания калия в плазме крови, снижение массы тела;	нечасто: припухлость суставов, миалгия, подергивания мышц, боль в шее, скованность мышц; редко: рабдомиолиз. *Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей:* нечасто: дизурия, недержание мочи; редко: почечная недостаточность, олигурия, задержка мочи. *Нарушения со стороны половых органов и молочной железы:* часто: боль в области молочных желез, эректильная дисфункция; нечасто: задержка эякуляции, сексуальная дисфункция, дисменорея; редко: аменорея, выделения из молочных желез, увеличение молочных желез в объеме, гинекомастия. *Общие расстройства и нарушения в месте введения:* часто: отеки, в том числе периферические, нарушение походки, падения, чувство «опьянения», плохое самочувствие, утомляемость; нечасто: генерализованный отек, чувство «стеснения» в груди, боль, гипертермия, жажда, озноб, астения, недомогание; *Лабораторные и инструментальные данные:* часто: увеличение массы тела, повышение концентрации креатинина в плазме крови; нечасто: повышение активности, креатинфосфокиназы **в плазме крови**,

редко: снижение количества лейкоцитов в крови. *Нарушения со стороны иммунной системы:* нечасто: реакции гиперчувствительности; редко: ангионевротический отек, аллергические реакции.	повышение концентрации глюкозы в крови, снижение количества тромбоцитов в крови, снижение содержания калия в плазме крови, снижение массы тела; редко: снижение количества лейкоцитов в крови. *Нарушения со стороны иммунной системы:* нечасто: реакции гиперчувствительности; редко: ангионевротический отек, аллергические реакции.
Форма выпуска Капсулы, 25 мг, 50 мг, 75 мг, 100 мг, 150 мг, 200 мг, 225 мг, 300 мг. По 10 или 14 капсул в контурной ячейковой упаковке из комбинированного материала ПВХ/ПВДХ и фольги алюминиевой. 3, 6, 9, 10 контурных ячейковых упаковок (по 10 капсул) или 1, 2, 4, 6 контурных ячейковых упаковок (по 14 капсул) вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	**Форма выпуска** Капсулы, 25 мг, 50 мг, 75 мг, 100 мг, 150 мг, 200 мг, 225 мг, 300 мг. По 10 или 14 капсул в **блистере** из комбинированного материала ПВХ/ПВДХ и фольги алюминиевой. 3, 6, 9, 10 **блистеров** (по 10 капсул) или 1, 2, 4, 6 **блистеров** (по 14 капсул) вместе с инструкцией по применению помещают в пачку **картонную**.
Условия хранения При температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.	**Условия хранения** При температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке. **Относится к Перечню лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету.** Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска Отпускают по рецепту.	**Условия отпуска** Отпускают по рецепту. **Относится к Перечню лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету.**
Наименование и адрес держателя (владельца) регистрационного удостоверения ООО «КРКА-РУС», 143500, Россия, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50	**Наименование юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение, адрес** ООО «КРКА-РУС», 143500, Россия, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50
Производство готовой лекарственной формы ООО «КРКА-РУС», 143500, Россия, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50 Тел.: (495) 994-70-70 Факс: (495) 994-70-78 АО «КРКА, д.д., Ново место», Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения	**Производитель** **АО «КРКА, д.д., Ново место», Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения**
Первичная упаковка ООО «КРКА-РУС», 143500, Россия, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50 Тел.: (495) 994-70-70 Факс: (495) 994-70-78	

АО «КРКА, д.д., Ново место», Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения **Вторичная/потребительская упаковка** ООО «КРКА-РУС», 143500, Россия, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50 Тел.: (495) 994-70-70 Факс: (495) 994-70-78 АО «КРКА, д.д., Ново место», Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения **Производитель (Выпускающий контроль качества)** ООО «КРКА-РУС», 143500, Россия, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50 Тел.: (495) 994-70-70 Факс: (495) 994-70-78 АО «КРКА, д.д., Ново место», Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения **Наименование и адрес организации, принимающей претензии потребителей** ООО «КРКА-РУС», 125212, г. Москва, Головинское шоссе, дом 5, корпус 1 Тел.: (495) 981-10-95, факс: (495) 981-10-91	**Наименование и адрес организации, принимающей претензии потребителей** ООО «КРКА-РУС», 125212, г. Москва, Головинское шоссе, дом 5, корпус 1 Тел.: (495) 981-10-95, факс: (495) 981-10-91

Представитель фирмы Тамкович Т. В.