ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
СУЛЬФОКАМФОКАИН®

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Сульфокамфокаин®

Международное непатентованное название или группировочное название:
Сульфокамфорная кислота + Прокаин

Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Состав
кислоты сульфокамфорной в пересчете на безводную - 49,6 мг
прокаина - 50,4 мг
воды для инъекций до 1 мл.

Описание: прозрачная слегка желтоватая жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: аналептическое средство.

Код АТХ: R07AB

Фармакологические свойства
Комбинированный препарат, оказывает аналептическое действие. Стимулирует дыхательный и сосудодвигательные центры продолговатого мозга. Оказывает прямое действие на миокард, усиливая в нем обменные процессы, улучшая функции и повышая его чувствительность к симпатической импульсации. Повышает тонус периферических кровеносных сосудов. Улучшает легочную вентиляцию, легочный кровоток.
В связи с растворимостью в воде препарат быстро всасывается при подкожном и внутримышечном введении. Не вызывает образования инфильтратов и осложнений (олеом).
Возможно внутривенное введение.

Показания к применению
- острая и хроническая сердечная недостаточность;
- острая и хроническая дыхательная недостаточность;
- кардиогенный и анафилактический шок.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата (в том числе к новокаину).

С осторожностью: артериальная гипотензия.

Применение при беременности и в период кормления грудью
Ввиду отсутствия данных по применению сульфокамфокаина при беременности и в период грудного вскармливания, его применение в эти периоды не рекомендуется.

Способ применения и дозы
Сульфокамфокаин® применяют подкожно, внутримышечно или внутривенно по 2 мл 10 % раствора (0,2 г); при необходимости кратность введения составляет до 2-3 раз в сутки. Максимальная суточная доза для взрослых 12 мл 10 % раствора (1,2 г). В острых случаях препарат вводят внутривенно (медленно струйно или капельно) в разовой дозе 2 мл 10 % раствора.
Длительность применения устанавливают индивидуально. При хронической дыхательной и сердечной недостаточности вводят подкожно или внутримышечно в течение 20-30 дней.

Побочное действие
При применении препарата возможны диспептические расстройства, аллергические реакции. Возможно снижение артериального давления (особенно у пациентов с исходной артериальной гипотензией).

Передозировка
Нет сведений.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение сульфокамфокаина в сочетании с сердечными гликозидами, стероидными гормонами, анальгетиками усиливает аналептическое действие препарата.

Особые указания
Следует соблюдать осторожность при введении препарата больным с низким артериальным давлением в связи с возможностью развития гипотензивного действия новокаина, высвобождающегося в организме из сульфокамфокаина.

Форма выпуска
Раствор для инъекций 100 мг/мл.
По 2 мл в ампулы из нейтрального стекла. 10 ампул в коробку из картона или 5 или 10 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой или без фольги.
1 (по 5 или 10 ампул) или 2 (по 5 ампул) контурные упаковки помещают в пачку.
В пачку и коробку вкладывают инструкцию по применению, ампульный нож или скарификатор (при упаковке ампул с насечками, кольцами и точками для вскрытия ножи ампульные или скарификаторы не вкладывают).

Условия хранения
Список Б. В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 ^{0}С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек
По рецепту.

Производитель и организация, принимающая претензии:
ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА", 450077, г. Уфа, ул. Худайбердина, 28,
телефон/факс (347) 272 92 85

И.о. Директора ИДКЭЛС А.Н.Васильев

Представитель ОАО «Фармстандарт-УфаВита» Е.В. Толстова