ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

СУЛЬФОПРОКАИН

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Сульфопрокаин

Международное непатентованное название или группировочное название: Сульфокамфорная кислота + Прокаин

Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Состав
Активные вещества: сульфокамфорная кислота (в пересчете на безводную) – 49,6 г, прокаин (новокаин основание) – 50,4 г.
Вспомогательные вещества: вода для инъекций – до 1 л.

Описание: прозрачная слегка желтоватая жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: аналептическое средство

Код АТХ: [R07AB]

Фармакологические свойства
Комбинированный препарат. Стимулирует дыхательный и сосудодвигательные центры продолговатого мозга. Оказывает прямое действие на миокард, усиливает в нем обменные процессы, улучшает его функции и повышает его чувствительность к симпатической импульсации. Повышает тонус периферических кровеносных сосудов. Улучшает легочную вентиляцию, легочный кровоток. Увеличивает секрецию бронхиальных желез.
В связи с растворимостью в воде препарат быстро всасывается при подкожном и внутримышечном введении. Не вызывает образование инфильтратов и осложнений (олеом).

Показания к применению
- острая сердечная и дыхательная недостаточность;
- кардиогенный и анафилактический шок;
- для стимуляции дыхания при хронической дыхательной и сердечной недостаточности, пневмонии, инфекционных заболеваниях.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата (в том числе к прокаину), беременность, период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

С осторожностью

Артериальная гипотензия.

Способ применения и дозы

Подкожно, внутримышечно по 2 мл 10 % раствора, при необходимости кратность введения составляет до 2 – 3 раз в сутки.

В острых случаях препарат вводят внутривенно (медленно струйно или капельно) в разовой дозе - 2,0 мл 10% раствора.

При хронической дыхательной и сердечной недостаточности, пневмонии, инфекционных заболеваниях вводят подкожно или внутримышечно. Максимальная суточная доза 12 мл 10 % раствора (1,2 г). При необходимости курс лечения может составлять 20-30 дней. Длительность применения устанавливают индивидуально.

Побочные действия

Снижение артериального давления (особенно у пациентов с исходной артериальной гипотензией), диспептические расстройства, аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Совместим с сердечными гликозидами, стероидными гормонами, анальгезирующими средствами.

Форма выпуска

Раствор для инъекций.
По 2 мл в ампулах.
По 10 ампул помещают в коробки из картона с вкладышем из бумаги пачечной. В каждую коробку вкладывают нож ампульный или скарификатор и инструкцию по применению (при упаковке ампул с кольцом излома нож ампульный или скарификатор не вкладывают).

Условия хранения

Список Б. В защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.

Срок годности

3 года. Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Производитель

ОАО «Биосинтез».

Юридический адрес и адрес для принятия претензий

ОАО «Биосинтез», Россия, 440033 г. Пенза, ул. Дружбы, 4, тел/факс (8412) 57-72-69.

И.о. Директора ИДКЭ А.Н. Васильев

Генеральный директор
ОАО «Биосинтез» А.И. Черницов