

ИНСТРУКЦИЯ**ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА****Уропрост-Д****Регистрационный номер:****Торговое наименование:** Уропрост-Д**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Простаты экстракт

Лекарственная форма: суппозитории ректальные**Состав на один суппозиторий:**

Действующее вещество: простаты экстракт в пересчете на водорастворимые пептиды – 6 мг.

Вспомогательные вещества: диметилсульфоксид – 90 мг, макрогол 1500 (полиэтиленоксид 1500) – до получения суппозитория массой 2300 мг.

Описание

Суппозитории полупрозрачные с возможной мраморностью, почти бесцветные или с желтоватым или сероватым оттенком, торпедообразной формы. Допускается незначительное размягчение поверхностного слоя и «подпотевание» контурной ячейковой упаковки. Допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

Фармакотерапевтическая группа: Средства, применяемые в урологии; другие средства, применяемые в урологии.

Код АТХ: G04BX**Фармакологические свойства***Фармакодинамика*

Препарат обладает противовоспалительным и антиагрегационным действием, стимулирует мышцы мочевого пузыря.

Действующие вещества экстракта простаты относят к группе пептидных биорегуляторов – цитомединам. Эти лекарственные вещества представляют собой пептиды с молекулярной массой от 1 до 10 кДа. Низкомолекулярные пептиды пара- или аутокринной природы, выполняют функцию трансспецифичных внутри- и межклеточных мессенджеров.

Пептиды предстательной железы уменьшают время свертывания крови и повышают антиагрегационную активность сосудистой стенки, улучшают микроциркуляцию крови, усиливают фибринолитическую активность крови, увеличивают сократительную активность миоцитов детрузора *in vivo*, *in vitro*. Обладают иммуномодулирующим и

иммуностимулирующим действием, усиливают синтез антигистаминовых и антисеротониновых антител.

В основе применения пептидных биорегуляторов при лечении хронического простатита находится способность этих препаратов восстанавливать микроциркуляцию, оказывать не прямое противовоспалительное действие за счет усиления синтеза антигистаминовых и антисеротониновых антител, а также их иммуномодулирующее и иммуностимулирующее действие.

Лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы основано на важнейшем биологическом эффекте цитомединов: органотропности, позволяющей регулировать процессы дифференцировки и функции клеток в том органе, из которого они выделены.

Фармакокинетика

Как пептидный препарат, расщепляется клеточными протеазами до аминокислот. Кумулятивного действия не имеет.

Показания к применению

Хронический абактериальный простатит, состояние до и после операций на предстательной железе, доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

Противопоказания

Повышенная чувствительность компонентам препарата; возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат не предназначен для применения у женщин.

Способ применения и дозы

Препарат применяют ректально после самопроизвольной дефекации или очистительной клизмы. Смочив суппозиторий водой, вводят его глубоко в задний проход.

Применяют по 1 суппозиторию 2 раза в сутки (утром и вечером). После введения препарата желательно пребывание пациента в постели в течение 30-40 мин. Длительность лечения – 5-10 дней. По показаниям возможны повторные курсы лечения, которые рекомендуется проводить не ранее, чем через 2-4 недели.

Нежелательные реакции

Резюме нежелательных реакций

Частота возникновения побочных эффектов определялась в соответствии с классификацией Всемирной Организации Здравоохранения: очень часто ($\geq 1/10$), часто ($\geq 1/100$, $< 1/10$), нечасто ($\geq 1/1000$, $< 1/100$), редко ($\geq 1/10000$, $< 1/1000$), очень редко ($< 1/10000$) частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Нарушения со стороны иммунной системы: очень редко – аллергические реакции.

Желудочно-кишечные нарушения: нечасто – диарея, метеоризм.

Общие нарушения и реакции в месте введения: часто – зуд в заднем проходе.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаи передозировки не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат может применяться в составе комплексной терапии. Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

Особые указания

Препарат применяют только для лечения взрослых мужчин; не применяют у женщин и детей.

Лечение хронического простатита должно быть комплексным, предполагающим применение различных групп лекарственных препаратов и немедикаментозных методов лечения.

До начала лечения хронического простатита и, при необходимости, в процессе лечения рекомендуется проводить анализ секрета предстательной железы.

В период применения препарата для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы следует регулярно посещать врача для проведения стандартного контроля данного заболевания. Прежде чем начать курс лечения, необходимо убедиться, что патология носит доброкачественный характер.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные 6 мг.

По 5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной. По 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в пачке картонной.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять после окончания срока годности препарата.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель:

ООО «Альтфарм»

142073, Россия, Московская обл., г. Домодедово, д. Судаково, тер. Лесное, стр. 106

Тел.: +7 (495) 234-46-40

Организация, принимающая претензии:

ООО «Фармацевтические Технологии»

199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 75, лит. Б, пом. 209

Тел./факс +7 (812) 380-14-14

Владелец регистрационного удостоверения:

АО «Патент-Фарм», Россия

199106, г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., д. 75, литер Б, пом. 208

Тел./факс: +7 (812) 380-14-14