

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Пустырника настойка

Регистрационный номер:

Торговое наименование

Пустырника настойка

Международное непатентованное или группировочное наименование

Пустырника трава

Лекарственная форма

Настойка

Состав на 1000 мл

Для получения препарата используют:

Действующее вещество: пустырника трава - 200 г.

Вспомогательное вещество: этанол (этиловый спирт) 70 % - до 1000 мл.

Описание

Прозрачная жидкость зеленовато-коричневого цвета, слабого ароматного запаха.

Фармакотерапевтическая группа: Психолептики; снотворные и седативные средства; другие снотворные и седативные средства.

Код АТХ: N05CM

Фармакологические свойства

Оказывает выраженное седативное, умеренное кардиотоническое (замедляет ритм и увеличивает силу сердечных сокращений) действие, обладает умеренными гипотензивными свойствами.

Показания к применению

Препарат Пустырника настойка показан к применению у взрослых и детей старше 12 лет при повышенной нервной возбудимости, нарушении сна, неврастении, нейроциркуляторной дистонии.

Противопоказания

Гиперчувствительность, эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (фаза обострения), беременность, период грудного вскармливания, детский возраст (до 12 лет).

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, детский возраст от 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь за 30 мин до еды. Взрослым и детям старше 12 лет по 30–50 капель, разведенных в $\frac{1}{4}$ стакана воды, 3–4 раза в день. Курс лечения 3–4 недели.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Аллергические реакции, диспепсия.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки при правильном применении препарата не зарегистрировано.

При превышении рекомендуемых доз возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Усиливает действие снотворных и анальгезирующих лекарственных средств.

Особые указания

Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата составляет 0,55 г, в максимальной суточной дозе – 2,2 г.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Настойка.

По 20 мл, 25 мл во флаконы-капельницы стеклянные. По 25 мл во флаконы оранжевого стекла. Флакон-капельницу, флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре от 8 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

АО "Татхимфармпрепараты", Россия

420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

тел.: 8 800 201 98 88, тел./факс: +7 (843) 571-85-58

e-mail: marketing@tatpharm.ru

Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии от потребителей

АО "Татхимфармпрепараты", Россия

420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

тел.: 8 800 201 98 88, тел./факс: +7 (843) 571-85-58

e-mail: marketing@tatpharm.ru