

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА

Пустырника экстракт ФармВИЛАР

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Пустырника экстракт ФармВИЛАР.

Международное непатентованное или группировочное наименование: Пустырника травы экстракт.

Лекарственная форма: таблетки.

Состав (на одну таблетку):

Активный компонент: пустырника экстракт сухой – 14,0 мг.

Вспомогательные вещества: сахароза – 132,5 мг, лактозы моногидрат – 120,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая (тип 101 или 102) – 60,0 мг, крахмал картофельный – 40,0 мг, карбоксиметилкрахмал натрия – 10,0 мг, кальция стеарат – 3,5 мг.

Описание: таблетки круглые, плоскоцилиндрической формы, с фасками с двух сторон. От светло-серого с коричневатым оттенком до коричневого цвета с более темными и более светлыми вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа: психолептики; снотворные и седативные средства; другие снотворные и седативные средства.

Код АТХ: N05CM.

Фармакологические свойства

Оказывает успокаивающее действие, снижает частоту и увеличивает силу сердечных сокращений, проявляет гипотензивные свойства. По характеру действия близок к препаратам валерианы.

Показания к применению

Повышенная нервная возбудимость, неврастения, бессонница, нейроциркуляторная дистония.

Противопоказания

- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;
- язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (в том числе язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения);
- артериальная гипотензия;
- дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- дефицит лактазы, непереносимость лактозы;

- беременность;
- период грудного вскармливания;
- детский возраст до 12 лет.

С осторожностью

Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов.

Детский возраст с 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке 3-4 раза в день за 1 час до еды. Курс лечения – 3-4 недели. Проведение повторного курса возможно по рекомендации врача.

Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, диспепсия. Если у вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано. При случайной передозировке возможно усиление дозозависимых побочных эффектов. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Совместим с другими седативными и кардиологическими препаратами; усиливает действие снотворных и анальгезирующих средств.

Особые указания

Пациентам с сахарным диабетом следует учитывать, что одна таблетка препарата содержит 0,1 ХЕ.

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 2-х недель следует сообщить об этом лечащему врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Таблетки 14 мг. По 10 или 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

По 50 таблеток в банки темного стекла для хранения лекарственных средств в комплекте с крышкой навинчиваемой из полиэтилена ПЭВД.

1 банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке (в пачке картонной).

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель / Организация, принимающая претензии / Держатель РУ:

ООО НПО «ФармВИЛАР», Россия,

249096, Калужская обл., Малоярославецкий район, г. Малоярославец,

ул. Коммунистическая, д. 115.

Тел./факс: + 7 (48431) 2-27-18.