МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
№ 014839/01-280916
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Карсил®

драже 35 мг

Софарма АО, Болгария

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» _____ 20____ г.

280916

Старая редакция	Новая редакция
Взаимодействие с другими лекарственными средствами При совместном применении силимарина с пероральными контрацептивами и препаратами, которые используются при гормональной заместительной терапии, возможно уменьшение эффектов последних. Силимарин может усилить эффекты таких лекарств, как диазепам, алпразолам, кетоконазол, ловастатин, винбластин из-за его подавляющего действия на систему цитохрома Р 450. **Представительство Софарма АО в Москве** 109004, ул. Таганская д. 17-23, эт. 10 Тел.: (495) 799 55 11; факс: (495) 799 55 22.	**Взаимодействие с другими лекарственными средствами** *Фармакодинамические лекарственные взаимодействия* Силимарин не оказывает существенного влияния на фармакодинамику других лекарственных препаратов. При совместном применении силимарина с пероральными контрацептивами и препаратами, которые используются при гормональной заместительной терапии, возможно уменьшение эффектов последних. *Фармакокинетические лекарственные взаимодействия* Силимарин может усилить эффекты таких лекарств, как диазепам, алпразолам, кетоконазол, ловастатин, винбластин из-за

Старая редакция	Новая редакция
	его подавляющего действия на систему цитохрома Р 450. Клинические исследования показывают незначительный риск возможных фармакокинетических взаимодействий силимарина, как ингибитора изофермента CYP3A4 и UGT1A1, и цитостатиков, которые являются субстратами этих ферментов. . **Претензии потребителей и информацию о нежелательных явлениях следует направлять по адресу:** Представительство АО "Софарма" (Болгария) г. Москва Российская Федерация, 109429, Москва, МКАД, 14 км, д. 10. Тел.: (495) 786-2226

Представитель фирмы

"СОФАРМА" (Болгария)

Саркисов В. В.