МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-004150- 26 07 19
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Гидрасек
капсулы, 100 мг
СОФАРТЕКС, Франция

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 26 07 19 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Только для взрослых. Для приема внутрь. Первую капсулу в начале лечения принимают независимо от времени суток. Далее – одну капсулу три раза в день перед едой. Лечение необходимо продолжать до нормализации стула (появления нормального кала до двух раз), но не более 7 дней. Не рекомендуется применять рацекадотрил длительное время. ***Особые группы пациентов*** *Пациенты пожилого возраста*: коррекция дозы препарата для пациентов пожилого возраста не требуется.	**Способ применения и дозы** Только для взрослых. Для приема внутрь. Первую капсулу в начале лечения принимают независимо от времени суток. Далее – одну капсулу три раза в день перед едой. Лечение необходимо продолжать до нормализации стула (появления нормального кала до двух раз), но не более 7 дней. Не рекомендуется применять рацекадотрил длительное время. Если после 3 дней лечения не наблюдается улучшения, следует обратиться к врачу. ***Особые группы пациентов*** *Пациенты пожилого возраста*: коррекция дозы препарата для пациентов пожилого возраста не требуется.
Форма выпуска Капсулы, 100 мг. По 10 капсул в блистеры из	**Форма выпуска** Капсулы, 100 мг. По 10 капсул в блистеры из

Старая редакция	Новая редакция
ПВХ/ПВДХ/Ал фольги. По 1, 2 блистера в пачку картонную вместе с инструкцией по применению. **Условия отпуска** Отпускают по рецепту.	ПВХ/ПВДХ/Ал фольги. По 1 блистеру в пачку картонную вместе с инструкцией по применению. **Условия отпуска** Отпускают без рецепта.

Старший менеджер департамента регистрации
ООО «Эбботт Лэбораториз» **М. Щуклин**