МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Ретинола ацетат-ЛекТ

раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) 3,44 %

Открытое акционерное общество «Тюменский химико-фармацевтический завод» (ОАО «ТХФЗ»), Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 160421 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения **РЕТИНОЛА АЦЕТАТ-ЛекТ**	**ИНСТРУКЦИЯ** ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА **РЕТИНОЛА АЦЕТАТ-ЛекТ**
Лекарственная форма: Раствор в масле для приема внутрь и наружного применения	**Лекарственная форма:** Раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный)
Состав *Активные компоненты*: ретинола ацетат (в пересчете на 100% ретинола ацетат) – 34,4 г; *Вспомогательные вещества*: бутилгидрокситолуол (Е321) – 1,5 г,	**Состав** *Действующее вещество* ретинола ацетат (в пересчете на 100 % ретинола ацетат) – 34,4 г; *Вспомогательные вещества*: бутилгидрокситолуол (Е321) – 1,5 г,

соевых бобов масло рафинированное, дезодорированное до 1 л. Ретинола ацетат раствор в масле для приема внутрь и наружного применения 3,44 % содержит в 1 мл от 90000 до 110000 МЕ, а в капле: 3000 МЕ при дозировании из глазной пипетки, 5000 МЕ при дозировании из капельницы. **Форма выпуска** Раствор в масле для приема внутрь и наружного применения 3,44%. По 10; 15; 30; 50 мл во флакон из оранжевого стекла, флаконы укупоривают пробкой пластмассовой и навинчиваемой крышкой из пластмассы. Или по 10, 15 мл во флакон стеклянный из коричневого стекла с винтовой горловиной, укупоренный пластмассовой пробкой с капельницей для укупорки лекарственных средств, пластмассовой навинчиваемой крышкой с уплотняющим элементом и обеспечивающей контроль первого вскрытия. Флакон помещен в пачку из картона с инструкцией по применению.	масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное до 1 л. Ретинола ацетат раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) 3,44 % содержит в 1 мл от 90000 до 110000 МЕ, а в капле: 3000 МЕ при дозировании из глазной пипетки, 5000 МЕ при дозировании из капельницы. **Форма выпуска** Раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) 3,44 %. По 10; 15; 30; 50 мл во флаконах из оранжевого стекла. Флаконы укупоривают пробкой пластмассовой и навинчиваемой крышкой из пластмассы. По 10, 15 мл во флакон стеклянный из коричневого стекла с винтовой горловиной, укупоренный пластмассовой пробкой с капельницей для укупорки лекарственных средств, пластмассовой навинчиваемой крышкой с уплотняющим элементом и обеспечивающей контроль первого вскрытия. Флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона коробочного.

Условия хранения Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 10 °С. Хранить в недоступном для детей месте. **Производитель/ Организация, принимающая претензии от потребителей** ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод», Россия 625005, г. Тюмень, ул. Береговая, д. 24. Телефон/факс: (3452) 22-52-86.	**Условия хранения** Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 10 °С. Хранить в недоступном для детей месте. **Производитель / Организация, принимающая претензии от потребителей** ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод», Россия 625005, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Береговая, д. 24 Телефон/факс: (3452) 22-52-86

Представитель
ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод» А.И. Забелин