МИНЗДРАВ РОССИИ
П N015481/01- 140213
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

П N015481/01-150211

ВИРАЗОЛ® (VIRAZOLE®)

Концентрат для приготовления раствора для инфузий

Легаси Фармасьютикалс Швейцария ГмбХ, Швейцария

Legacy Pharmaceuticals Switzerland GmbH, Switzerland

Изменение № 1

Дата внесения Изменения с «____» 140213 20____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Виразол® концентрат для приготовления раствора для инфузий вводят внутривенно. Доза Виразола® концентрата для приготовления раствора для инфузий для каждого пациента рассчитывается индивидуально в зависимости от массы тела. Перед введением концентрированный раствор Виразола для инфузий необходимо развести 5% раствором декстрозы для инъекций или 0,9% раствором натрия хлорида для инъекций. Общий объем вводимого раствора доводят до 100 мл. Полученный раствор вводят путем инфузии через перфузор в течение 30 минут. При струйном введении Виразола® у больных может возникать озноб, поэтому	**Способ применения и дозы** Виразол® концентрат для приготовления раствора для инфузий вводят внутривенно. Доза Виразола® концентрата для приготовления раствора для инфузий для каждого пациента рассчитывается индивидуально в зависимости от массы тела. Перед введением концентрированный раствор Виразола для инфузий необходимо развести 5% раствором декстрозы для инъекций или 0,9% раствором натрия хлорида для инъекций. Общий объем вводимого раствора доводят до 100 мл. Полученный раствор вводят путем инфузии через перфузор в течение 30 минут. При струйном введении Виразола® у больных может возникать озноб, поэтому

препарат рекомендуется вводить медленно в течение 10 -15 минут.

Концентрат Виразола® для внутривенных инфузий не содержит консервантов, и после разведения должен быть использован в течение 24 часов.

Начальная нагрузочная доза составляет 33 мг/кг массы тела. Через 6 часов после этой дозы начинают вводить по 16 мг/кг массы тела через каждые 6 часов в течение 4 дней (всего 16 доз). Через 8 часов после введения последней из этих доз начинают применять препарат по 8 мг/кг каждые 8 часов в течение 3 дней (9 доз). (Таблица 1).

Таблица 1

Время / День	8:00	14:00	20:00	2:00
1	33 мг/кг	16 мг/кг	16 мг/кг	16 мг/кг
2	16 мг/кг	16 мг/кг	16 мг/кг	16 мг/кг
3	16 мг/кг	16 мг/кг	16 мг/кг	16 мг/кг
4	16 мг/кг	16 мг/кг	16 мг/кг	16 мг/кг
Время / День	8:00	16:00	00:00	
5	8 мг/кг	8 мг/кг	8 мг/кг	
6	8 мг/кг	8 мг/кг	8 мг/кг	
7	8 мг/кг	8 мг/кг	8 мг/кг	

Лечение Виразолом® в данной дозе может быть продолжено в зависимости от состояния больного и назначения лечащего врача, но не должно превышать 14 дней.

Рекомендуемый режим введения Виразола®

препарат рекомендуется вводить медленно в течение 10 -15 минут.

Концентрат Виразола® для внутривенных инфузий не содержит консервантов, и после разведения должен быть использован в течение 24 часов.

Начальная нагрузочная доза составляет 33 мг/кг массы тела. Через 6 часов после этой дозы начинают вводить по 16 мг/кг массы тела через каждые 6 часов в течение 4 дней (всего 16 доз). Через 8 часов после введения последней из этих доз начинают применять препарат по 8 мг/кг каждые 8 часов в течение 3 дней (9 доз). (Таблица 1).

Таблица 1

Время / День	8:00	14:00	20:00	2:00
1	33 мг/кг	16 мг/кг	16 мг/кг	16 мг/кг
2	16 мг/кг	16 мг/кг	16 мг/кг	16 мг/кг
3	16 мг/кг	16 мг/кг	16 мг/кг	16 мг/кг
4	16 мг/кг	16 мг/кг	16 мг/кг	16 мг/кг
Время / День	8:00	16:00	00:00	
5	8 мг/кг	8 мг/кг	8 мг/кг	
6	8 мг/кг	8 мг/кг	8 мг/кг	
7	8 мг/кг	8 мг/кг	8 мг/кг	

Лечение Виразолом® в данной дозе может быть продолжено в зависимости от состояния больного и назначения лечащего врача, но не должно превышать 14 дней.

одинаков для лечения геморрагической лихорадки с почечным синдромом, как у взрослых, так и у детей. **Производитель** МЕДА Фармасьютикалс Швейцария ГмбХ, Швейцария; произведено Легаси Фармасьютикалс Швейцария ГмбХ, Рюрбергштрассе 21, 4127 Бирсфельден, Швейцария. Претензии направлять в адрес представительства в Москве: 125167 Россия, Москва, Нарышкинская аллея, д.5 стр.2 тел.(495) 748-51-93	**Производитель:** МЕДА Фармасьютикалс Швейцария ГмбХ, Швейцария; произведено Легаси Фармасьютикалс Швейцария ГмбХ, Рюрбергштрассе 21, 4127 Бирсфельден, Швейцария. Претензии направлять в адрес представительства в Москве: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д.29 Тел. (495) 660-5303 Факс (495) 660-5306

Представитель фирмы Семина И.В.