МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-002308- 091221
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ИНСТРУКЦИЯ
# ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Рифампицин-Ферейн®
(торговое наименование лекарственного препарата)

Рифампицин
(международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование)

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 600 мг
(лекарственная форма, дозировка)

ПАО «Брынцалов-А», Россия
(наименование фирмы-производителя, страна)

**Изменение № 1**

Дата внесения Изменения «____» 091221 20__ г.

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| 1 | 2 |
| **Показания к применению**<br>Туберкулез (все формы) - в составе комбинированной терапии.<br>Лепра (в комбинации с другими противомикробными препаратами, активными в отношении Mycobacterium leprae).<br>Инфекционные заболевания, вызванные чувствительными микроорганизмами (в случаях резистентности к другим антибиотикам и в составе комбинированной противомикробной терапии; после исключения диагноза туберкулеза и лепры).<br>Бруцеллез - в составе комбинированной терапии с антибиотиками группы тетрациклинов (доксициклином). | **Показания к применению**<br>Туберкулез (все формы)<br>В составе комбинированной терапии.<br>Лепра<br>В комбинации с другими противомикробными препаратами, активными в отношении Mycobacterium leprae.<br>Инфекционные заболевания, вызванные чувствительными микроорганизмами<br>В случаях резистентности к другим антибиотикам и в составе комбинированной противомикробной терапии (после исключения диагноза туберкулеза и лепры).<br>Бруцеллез<br>В составе комбинированной терапии с анти- |

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Менингококковый менингит (профилактика у лиц, находящихся в тесном контакте с заболевшими менингококковым менингитом; у бациллоносителей Neisseria meningitidis). | биотиками группы тетрациклинов (доксициклином).<br>Менингококковый менингит<br>Профилактика у лиц, находящихся в тесном контакте с заболевшими менингококковым менингитом; у бациллоносителей Neisseria meningitidis. |
| **Противопоказания**<br>Повышенная чувствительность к рифампицину и/или другим компонентам препарата, желтуха, недавно перенесенный (менее 1 года) инфекционный гепатит, период грудного вскармливания, хроническая почечная недостаточность, легочно-сердечная недостаточность II-III степени, грудной возраст до 2 месяцев. | **Противопоказания**<br>Повышенная чувствительность к рифампицину и/или другим компонентам препарата, желтуха, недавно перенесенный (менее 1 года) инфекционный гепатит, хроническая почечная недостаточность, легочно-сердечная недостаточность II-III степени, детский возраст до 2 месяцев, беременность (только по «жизненным» показаниям), период лактации, одновременный прием с ритонавиром, саквинавиром, атазанавиром, дарунавиром, фосампренавиром, типрановиром, ампренавиром, индинавиром, лопинавиром, нелфинавиром. |
| **С осторожностью**<br>Беременность (только «жизненным» показаниям). | **С осторожностью**<br>При порфирии, у пациентов, злоупотребляющих алкоголем, при указаниях на заболевания печени в анамнезе, у истощенных пациентов. При возобновлении лечения рифампицином после перерыва. |

Начальник отдела регистрации
лекарственных препаратов
ПАО «Брынцалов-А»

Е.И. Осипова