

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

АЗУЛАН

Регистрационный номер:**Торговое наименование:** Азулан**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Ромашки аптечной цветков экстракт**Лекарственная форма:** раствор для приема внутрь, местного и наружного применения**Состав на 100 г препарата***Активные компоненты*

Ромашки экстракт жидкий (44 : 100)* с содержанием суммы флавоноидов в пересчете на рутин 0,25 %	— 95,881 г
Гвайазулен в пересчете на 100 % вещество	— 0,037 г

Вспомогательный компонент

Твин 80 (полисорбат 80)	— 4,082 г
-------------------------	-----------

*Ромашки экстракт жидкий (44 : 100) получают из цветков ромашки аптечной (ромашки ободранной) – *Chamomilla recutita* (L.) Rausch. (*Matricaria recutita* L., *M. chamomilla* L.), семейство астровые – Asteraceae (ГФ XIII, ФС.2.5.0037.15 «Ромашки аптечной цветки»); экстрагент – спирт этиловый 50 %, аммиака раствор 10 % до pH (8,0-8,5), соотношение сырье : конечный экстракт – 44 : 100.

Описание

Жидкость от коричневого с зеленоватым оттенком до темно-коричневого с красноватым оттенком цвета с характерным запахом. При хранении допускается появление осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие лечебные средства.

Код АТХ

V03AX.

Фармакологические свойства*Фармакодинамика*

Комбинированный препарат. Оказывает противовоспалительное, спазмолитическое и ветрогонное действие, обладает умеренными противомикробными свойствами.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

Внутрь: в комплексной терапии гастрита, дуоденита, колита, метеоризма.

Местно: при воспалительных заболеваниях слизистых оболочек полости рта (стоматит, гингивит, пародонтит), вагинитах.

Наружно: при воспалительных заболеваниях кожи (трещины, укусы насекомых и др.).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и растениям семейства астровых.

При приеме внутрь: беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

С осторожностью

Бронхиальная астма, атопический дерматит в анамнезе.

При приеме внутрь: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, эпилепсия.

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата внутрь во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Внутрь, взрослым и детям с 12 лет при желудочно-кишечных заболеваниях: препарат принимают в разведенном виде – по 2,5 мл ($\frac{1}{2}$ чайной ложки) на стакан (200 мл) теплой воды 2-3 раза в день. Курс лечения – 2-3 недели. Проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Наружно при воспалительных заболеваниях кожи (повязки, промывания, компрессы) и местно при воспалительных заболеваниях слизистых оболочек (в виде микроклизм по 50-100 мл, полосканий, влагалищных спринцеваний) препарат применяют в разведенном виде – 7,5 мл ($\frac{1}{2}$ столовой ложки) на 1 л воды.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (контактный дерматит, аллергический конъюнктивит, бронхоспазм, отек Квинке, анафилактический шок).

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

В связи с ингибирующим действием экстракта ромашки на микросомальные ферменты печени, не рекомендуется одновременное применение препарата с антикоагулянтами (варфарин) в связи с повышением риска развития кровотечения.

Особые указания

Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течении 14 дней, следует сообщить об этом лечащему врачу.

Содержание этилового спирта в препарате составляет не менее 32,0 %.

При приеме внутрь в максимальной разовой дозе препарата содержание абсолютного этилового спирта (этанола) составляет около 0,63 г, в максимальной суточной дозе – около 1,89 г.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения при приеме препарата внутрь следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Раствор для приема внутрь, местного и наружного применения.

По 50 или 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками и крышками навинчиваемыми.

По 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные колпачками алюминиевыми с перфорацией с прокладками полимерными.

По 100 мл во флаконы из полиэтилентерфталата коричневого цвета с колпачками системы контроля первого вскрытия.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д.14.

Держатель регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.