

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Рябины плоды
(*Sorbi aucupariae fructus*)

Регистрационный номер

Торговое наименование. Рябины плоды.

Международное непатентованное или группировочное наименование. Рябины обыкновенной плоды.

Лекарственная форма. Плоды цельные.

Состав. Плоды рябины обыкновенной.

Характеристика.

Плоды рябины содержат каротин, аскорбиновую кислоту, витамины группы В, витамин Р, сорбозу, органические кислоты, дубильные и горькие вещества, флавоноиды и другие биологически активные вещества.

Описание.

Плоды яблокообразные, одиночные или слипшиеся по несколько штук, 2-5-гнездные, округлые или овально-округлые, с блестящей, реже матовой поверхностью, в поперечнике до 9 мм, сильно морщинистые, на верхушке с остающейся чашечкой из пяти малозаметных смыкающихся зубчиков. Цвет плодов от красновато- или желтовато-оранжевого до коричневатого-красного, иногда с беловатым налетом выкристаллизовавшегося сахара. Запах слабый, характерный. Вкус водного извлечения кисловато-горький.

Фармакотерапевтическая группа.

Поливитаминное средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.

Благодаря высокому содержанию витаминов настой плодов рябины оказывает общеукрепляющее действие на организм; обладает также диуретическими, гипотензивными и желчегонными свойствами.

Показания к применению.

Профилактика гипо- и авитаминозов.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к препарату, детский возраст до 3 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Применение возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы.

Около 10 г (1 столовая ложка) плодов рябины помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой, нагревают на кипящей водяной бане 15 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Настой принимают внутрь 2 раза в день после еды: взрослые и дети старше 12 лет – по 1/2 стакана, дети от 6 до 12 лет – по 1/4 стакана, дети от 3 до 5 лет – по 2 столовые ложки. Курс лечения 2 недели.

Перед применением настоя рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не описано.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Плоды цельные. По 50 г, 75 г, 100 г плодов цельных в пачках из картона с контролем первого вскрытия с внутренним пакетом из бумаги с термосвариваемым полипропиленовым слоем или бумаги с термосвариваемым полиэтиленовым слоем, или материала комбинированного многослойного, или полипропилена.

Инструкция по применению вкладывается в пачку или текст инструкции по применению наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С; приготовленный настой – в прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности.

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель / Держатель регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии

АО «Красногорсклексредства»

Россия, 143444, Московская обл., г. Красногорск, ул. Мира (Опалиха мкр.), д. 25

Тел.: +7 (495) 705-93-80 • Факс: +7 (495) 705-93-82 • krls@krls.ru

Адрес производственной площадки (выпускающий контроль качества): Россия, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 25