

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения
САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА

Регистрационный номер:

Торговое название: Салициловая кислота

Международное непатентованное название или группировочное название: Салициловая кислота

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав.

Активное вещество:

Салициловая кислота - 2 г, 5 г или 10 г

Вспомогательное вещество:

Вазелин - до 100 г

Описание. Однородная мазь от белого до светло-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа. Кератолитическое средство.

Код АТХ: [D01AE12]

Фармакологические свойства. Оказывает кератолитическое, антисептическое, местно-раздражающее и противовоспалительное действие.

Показания к применению. Воспалительные и инфекционные поражения кожи: ожоги, раны, псориаз, жирная себорея, экзема, отрубевидный лишай, дискератоз, ихтиоз.

Противопоказания. Гиперчувствительность к салициловой кислоте, детский возраст, почечная недостаточность, беременность и период лактации.

Способ применения и дозы. Наружно. Мазь наносят на пораженные участки кожи тонким слоем 1-2 раза в день. При лечении ожогов и ран после нанесения мази пораженную поверхность закрывают стерильной салфеткой или накладывают стерильную повязку, пропитанную мазью (перед наложением поверхность очищают от некротических тканей, вскрывают пузыри, промывают антисептическим раствором). Смену повязки производят 1 раз в 2-3 дня до полного очищения от гнойно-некротических масс. Курс лечения индивидуален и зависит от тяжести заболевания.

Побочное действие. Редко – местные аллергические реакции в виде зуда, жжения, кожной сыпи, гиперемии кожи.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами. Салициловая кислота может повысить проницаемость кожи для других лекарственных средств для местного применения и тем самым усилить их всасывание. Всосавшаяся салициловая кислота может усилить побочные эффекты метотрексата и пероральных гипогликемических лекарственных средств, производных сульфонилмочевины.

Особые указания. Не следует наносить препарат на родимые пятна, бородавки, в том числе, в области гениталий или лица. При попадании на слизистые оболочки необходимо промыть соответствующую область большим количеством воды. Необходимо учитывать, что при заболеваниях, протекающих с гиперемией и воспалением или с поверхностными мокнущими поражениями возможно повышение всасывания салициловой кислоты.

Воздействие на способность водить автомобиль и работать с техникой. Не наблюдалось.

Форма выпуска. Мазь для наружного применения 2 %, 5 %, 10 %. По 25 г, 40 г в банки оранжевого стекла. По 30 г, 40 г в тубы алюминиевые. По 36 банок вместимостью 40 г; по 64 банки вместимостью 25 г с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку из картона. Каждую банку, тубу с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Допускается наносить полный текст инструкции на пачку.

Условия хранения. В защищенном от света месте при температуре от 12 °С до 25 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности. 2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска. Без рецепта.

Предприятие-производитель/

Организация, принимающая претензии


ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика»

Россия, 170024, г. Тверь, Старицкое шоссе, д. 2

Тел. (4822) 44-47-26, факс (4822) 44-41-19

Заместитель генерального директора по качеству

ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» »



В.Н. Веселова