одобрено Фармакологическим Комитетом МЗ РФ

“ _____ ”_____200__ г.

_____

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

Колломак (Collomack)

Регистрационный номер:

Торговое (патентованное) название препарата: Колломак (Collomack)
Международное непатентованное название: отсутствует
Химическое название: Салициловая кислота, Молочная кислота, Полидоканол 600.
Лекарственная форма: Раствор для наружного применения.

Состав

10 г раствора содержат:

Активные ингредиенты:

Салициловой кислоты - 2,0 г, Молочной кислоты - 0,5 г, Полидоканола 600 - 0,2 г.

Прочие ингредиенты:

Дибутилфталат - 0,10 г, Этилцеллюлоза - 0,55 г, Ацетон - 6,65 г.

Описание

Вязкая, прозрачная, желтоватая жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Кератолитическое средство (для растворения рогового слоя кожи).

Показания к применению

Бородавки, мозоли, ороговения кожи, омозолелости, остроконечные кондиломы.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к салициловой кислоте или другим компонентам препарата.

Не следует применять у младенцев, а также наносить на родимые пятна, волосистые бородавки, бородавки в области гениталий или лица.

Не следует применять у пациентов с нарушениями функции почек (почечной недостаточностью). У этих пациентов применение препаратов, содержащих

салицилаты, возможно только при соблюдении особых условий и с особой осторожностью.

Особые указания

Колломак не должен соприкасаться со слизистыми оболочками, в особенности следует избегать попадания в глаза. Если это произошло, то следует промыть соответствующую область большим количеством воды.
После употребления следует плотно закрыть флакон!

Применение при беременности и лактации

В период беременности применение Колломака допустимо только при нанесении его на ограниченную поверхность (не более 5 $см^2$).
При использовании Колломака в соответствии с показаниями допустимо продолжение грудного кормления в ходе лечения. Только следует избегать случайного приема младенцем препарата внутрь путем контакта с обработанными поверхностями тела.

Способ применения и дозы

Если врач не назначил иначе, то следует наносить на пораженные участки кожи одну каплю Колломака 1-2 раза в день.
У взрослых можно применять в течение одного дня не более 2,0 г салициловой кислоты, что приблизительно соответствует 10,0 мл Колломака.
У детей не допускается превышение суточной дозы салицилата, составляющей 0,2 г салициловой кислоты, что приблизительно соответствует 1,0 мл Колломака. При лечении детей не следует обрабатывать несколько участков кожи одновременно.
Продолжительность лечения:
Как правило, через 3-4 дня удается удалить мозоли и омозолелости после принятия теплой ножной ванны.
При использовании максимально допустимой суточной дозировки (10,0 мл у взрослых и 1,0 мл у детей) длительность лечения не должна превышать 1 недели.
Длительность лечения устанавливается в соответствии с полученными результатами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Салициловая кислота может повысить проницаемость кожи для других лекарственных средств местного применения и тем самым усилить их поступление в организм, а также усилить нежелательное действие метотрексата и сахаропонижающее действие пероральных противодиабетических препаратов типа сульфанилмочевины.

Побочные эффекты

Изредка возможно местное раздражение кожи (жжение и покраснение).
В отдельных случаях возможно развитие кожных аллергических реакций при контакте с препаратом.

Передозировка и другие ошибки при приеме

При наружном применении препаратов салициловой кислоты обычно не следует ожидать развития токсических побочных действий даже в случае непреднамеренного кратковременного превышения указанных максимальных дозировок. Возможно появление местного раздражения кожи. В качестве меры противодействия достаточно

удалить препарат. В случае непреднамеренного проглатывания препарата необходимо немедленно промыть рот большим количеством воды и обратиться за помощью к врачу.

Форма выпуска

Раствор **для наружного применения**. (По 10 мл препарата во флаконе коричневого стекла с навинчиваемой герметичной крышкой из пластмассы, с палочкой-кисточкой для нанесения препарата. Один флакон с инструкцией по применению помещен в картонную пачку.)

Условия хранения

При температуре не выше 25°С, в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года

Не следует использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Отпуск без рецепта.

Название и адрес изготовителя:

«Генрих Мак Насл. Гмбх и Ко. КГ»; *Ул. Генрих Мак, 35;*
89257 Иллертиссен; федеральная земля: Бавария; Германия

«Heinrich Mack Nachf. Gmbh & Co. KG»; Heinrich-Mack-Str. 35;
89257 Illertissen ; Bundesland; Bayern;Deutschland