

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Гальманин

наименование лекарственного препарата

Регистрационный номер:

Торговое наименование Гальманин.

Международное непатентованное или группировочное наименование

Салициловая кислота + Цинка оксид

Лекарственная форма Порошок для наружного применения.

Состав на 100 г:

Действующие вещества:

Салициловая кислота – 2 г

Цинка оксид – 10 г

Вспомогательные вещества:

Тальк – 44 г

Крахмал картофельный – 44 г

Описание Порошок белого или серовато-белого цвета, жирный на ощупь.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептики и дезинфицирующие средства; другие антисептики и дезинфицирующие средства.

Код АТХ: D08AX

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат наружного применения. Салициловая кислота оказывает противовоспалительное, антисептическое и кератолитическое действие. Цинка оксид оказывает подсушивающее действие.

Показания к применению

Подострая экзема различного генеза, гипергидроз (потливость) стоп.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к салициловой кислоте, цинка оксиду и другим компонентам препарата.

Детский возраст до 12 лет.

Острые гнойно-воспалительные заболевания. Не наносить на раневую поверхность.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

При беременности и в период грудного вскармливания применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Перед применением препарата Гальманин, если Вы беременны, или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно. В виде присыпки тонким слоем порошок наносится на пораженные участки кожи и чистую (вымытую с мылом и вытертую насухо) кожу 1 раз в день.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Аллергические реакции, местные реакции – зуд, жжение. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При наружном применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами не изучалось.

Особые указания

Не допускать попадания в глаза. Следует избегать прямого или продолжительного вдыхания препарата. Сообщалось о случаях повреждения легких (в том числе серьезных) при непреднамеренном вдыхании большого количества порошка детских присыпок и других содержащих тальк средств или их длительном ингаляционном воздействии. При попадании большого количества препарата в дыхательные пути взрослого или ребенка следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять автотранспортом и механизмами

Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Порошок для наружного применения.

По 2 г, 5 г, 10 г, 20 г и 25 г в термосвариваемые пакеты из материала упаковочного комбинированного; материала комбинированного «Буфлен» или ламинированная бумага.

По 3, 5, 10, 12, 20, 25 или 30 пакетов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

По 20 г, 30 г, 40 г и 50 г в банки, флаконы, флаконы-капельницы из полиэтилена высокого или низкого давления в комплекте с крышками или в банки, флаконы из полиэтилентерефталата со средствами укупорочными.

Каждую банку, флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается полный текст инструкции по применению наносить на пачку.

По 50, 100, 200, 400 пакетов без пачки вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку картонную (для стационаров).

По 30 или 40 банок, флаконов, флаконов-капельниц без пачки вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку картонную (для стационаров).

Срок годности

5 лет. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / производитель /организация, принимающая претензии потребителей:

АО «Ивановская фармацевтическая фабрика», Россия

153007, Ивановская обл., г.о. Иваново, г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 19А

Тел.: 8 (493) 233-42-73

E-mail: ivff@yandex.ru