

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Салицилово-цинковая паста**Регистрационный номер:****Торговое наименование:** Салицилово-цинковая паста**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Салициловая кислота + Цинка оксид**Лекарственная форма:** паста для наружного применения**Состав****100 г препарата содержат:***Действующие вещества*

Салициловая кислота 2,0 г

Цинка оксид 25,0 г

Вспомогательные вещества

Крахмал картофельный 25,0 г

Вазелин 48,0 г

Описание: однородная паста от белого до белого с желтоватым или сероватым оттенком цвета.**Фармакотерапевтическая группа:** антисептики и дезинфицирующие средства; другие антисептики и дезинфицирующие средства.**Код АТХ:** D08AX**Фармакологические свойства**

Комбинированный препарат для наружного применения. Салициловая кислота оказывает противовоспалительное, антисептическое, кератолитическое и местнораздражающее действие. Цинка оксид оказывает подсушивающее действие.

Показания к применению

Подострая экзема различного генеза, потливость ног.

Противопоказания

Гиперчувствительность к салициловой кислоте, оксиду цинка и другим компонентам препарата.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно.

Наносят на пораженные участки кожи 1-2 раза в день. Курс лечения не должен превышать 2-х недель. Если после лечения улучшение не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Режим дозирования для детей в возрасте от 12 до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.

Эффективность и безопасность препарата Салицилово-цинковая паста у детей в возрасте от 0 до 12 лет не установлены. Данные отсутствуют.

Побочное действие

При применении препарата возможны местные реакции (жжение, зуд, гиперемия), аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При чрезмерном нанесении препарата возможно усиление побочных эффектов. Лечение: симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Салициловая кислота может повысить проницаемость кожи для других лекарственных средств наружного применения и тем самым усилить их всасывание. Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Особые указания

Не следует наносить препарат на слизистые оболочки. Не наносить на мокнущие раны. Не допускать попадания препарата в глаза.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторной реакции.

Форма выпуска

По 15 г, 20 г, 25 г или 30 г в банки темного стекла типа БТС, закупоренные крышками полиэтиленовыми из полиэтилена высокого давления, натягиваемыми с уплотнительным

элементом. На банки наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящиеся.

По 25 и 30 г в тубы алюминиевые, покрытые лаком, укупоренные бушоном из полиэтилена низкого давления. Каждую банку или алюминиевую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона. Пачки помещают в групповую упаковку.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (в пачке).

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии потребителей

Российская Федерация.

Акционерное общество «Усолъе-Сибирский химико-фармацевтический завод» (АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»).

665452, Иркутская обл., г.о. город Усолъе-Сибирское, тер. Промышленный массив, ул.

Индустриальная, зд. 62.

Тел.: +7 (395) 435-89-08.

Электронная почта: usolpharm@usolpharm.ru

Производитель

Российская Федерация.

Акционерное общество «Усолъе-Сибирский химико-фармацевтический завод» (АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»).

665452, Иркутская обл., г.о. город Усолъе-Сибирское, тер. Промышленный массив, ул.

Индустриальная, зд. 62.