

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Сальтос®

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 7,23 мг

Закрытое Акционерное Общество «Пульмомед», Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «___» 26 07 12 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое название: Сальтос®	Торговое название: Сальбутабс
Способ применения и дозы	Способ применения и дозы
Перорально. Взрослым и детям старше 12 лет - по одной таблетке Сальтос® 7,23 мг один раз в сутки во второй половине дня. Максимальная суточная доза 4 таблетки (24 мг сальбутамола).	Перорально. Взрослым и детям старше 12 лет - по одной таблетке 7,23 мг один раз в сутки во второй половине дня. Максимальная суточная доза 4 таблетки (24 мг сальбутамола).
Таблетку следует проглатывать целиком, не разжевывая.	Таблетку следует проглатывать целиком, не разжевывая.
Особые указания	Особые указания
Частое применение сальбутамола может привести к усилению бронхоспазма, внезапной смерти, в связи с чем между приемами очередных доз препарата необходимо делать перерывы в несколько часов (6	Частое применение сальбутамола может привести к усилению бронхоспазма, внезапной смерти, в связи с чем между приемами очередных доз препарата необходимо делать перерывы в несколько часов (6

Старая редакция	Новая редакция
ч). Сокращение этих интервалов может иметь место только в исключительных случаях. Применение таблеток Сальтос®, как правило, не оказывает отрицательного влияния на способность к вождению автотранспорта и другой деятельности, требующей особого внимания и быстрых реакций. Тем не менее, вопрос о возможности управления транспортным средством следует решать после оценки индивидуальной переносимости препарата. Таблетки с поврежденной оболочкой или разломанные не пригодны к применению. Форма выпуска Сальтос®, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой по 7,23 мг. По 30 таблеток во флаконе пластмассовом. Флакон с инструкцией в пачке из картона. Производитель / Организация принимающая претензии потребителя:	ч). Сокращение этих интервалов может иметь место только в исключительных случаях. Применение сальбутамола, как правило, не оказывает отрицательного влияния на способность к вождению автотранспорта и другой деятельности, требующей особого внимания и быстрых реакций. Тем не менее, вопрос о возможности управления транспортным средством следует решать после оценки индивидуальной переносимости препарата. Таблетки с поврежденной оболочкой или разломанные не пригодны к применению. Форма выпуска Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 7,23 мг. По 30 таблеток во флаконе пластмассовом. Флакон с инструкцией в пачке из картона. Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места

Старая редакция	Новая редакция
ЗАО "Пульмомед", Россия. 119071, Москва, Ленинский проспект, д.33, стр.3, пом.31-39. Тел./факс: (495) 954 6550, 952 4922 www.pulmomed.ru	производства ООО «Натива», Россия. Юридический адрес: 143401, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Октябрьская, д. 13 Тел. (495) 502-16-43 e-mail: info@nativa-pharm.ru www.nativa-pharm.ru Адрес производственной площадки: 143952, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Дзержинского, д. 40.

Генеральный директор
ООО «АБСхим»



А.Ю. Метлин