ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
СЕНАЛЕКС

Регистрационный номер

Торговое название препарата: Сеналекс
Группировочное название: Сеннозиды А и В

Лекарственная форма: таблетки

Состав

В 1 таблетке содержится:

Сенны листьев экстракт сухой, в виде суммы кальциевых солей сеннозидов А и В в пересчете на сеннозид В **

Вспомогательные вещества: карбоксиметилкрахмал натрия, крахмал, кремния диоксид коллоидный, кроскармеллоза, лактоза, тальк.

Описание

Круглые плоские таблетки со скошенными краями и риской с одной стороны, коричневого цвета, допускается наличие вкраплений более темного цвета.

Фармакотерапевтическая группа: слабительное средство растительного происхождения
Код АТХ: A06AB06

Фармакологические свойства

Оказывает стабильное действие, наступающее через 6–12 часов. Слабительный эффект обусловлен воздействием на рецепторы толстого кишечника, усиливающим перистальтику, что приводит к более быстрому опорожнению кишечника.

Показания к применению

Запоры, вызванные атонией, гипотонией и вялой перистальтикой толстого кишечника. Регулирование стула при геморрое, проктите, анальных трещинах.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, кишечная непроходимость, ущемленная грыжа, острые воспалительные заболевания брюшной полости (в т. ч. перитонит), желудочно-кишечное кровотечение,

метроррагия, спастические запоры, цистит, нарушение водно-электролитного обмена, детский возраст до 6 лет.

С осторожностью

Беременность, период лактации, печеночная и/или почечная недостаточность, состояния после полостных операций.

Способ применения и дозы :

Внутрь, обычно один раз в сутки перед сном, запивая водой.

Взрослые и дети старше 12 лет: по 1–2 таблетки. При отсутствии эффекта дозу можно увеличить до 3 таблеток на прием.

Дети 6 – 12 лет: по ½-1 таблетке и при необходимости увеличивают дозу до 2 таблеток.

В процессе подбора одну и туже дозу следует принимать в течение нескольких дней и постепенно увеличивать её на ½ таблетки. Если после достижения максимальной дозы в течение 3 дней эффекта достигнуть не удается, необходимо обратиться к врачу.

Побочное действие

Слабительное действие препарата может сопровождаться коликообразными болями в животе, метеоризмом. При длительном применении, особенно в высоких дозах, возможны нарушение водно-электролитного баланса, протеинурию, гематурия, отложения меланина в слизистой оболочке кишечника, тошнота, рвота, диарея, обесцвечивание мочи, кожная сыпь, утомляемость, судороги, сосудистый коллапс, спутанность сознания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При длительном применении в высоких дозах возможно усиление действия сердечных гликозидов и влияние на действие антиаритмических препаратов в связи с возможностью развития гипокалиемии.

При одновременном применении с тиазидными диуретиками, глюкокортикостероидами препаратами корня солодки увеличивается риск развития гипокалиемии.

Нарушает абсорбцию тетрациклинов.

Особые указания

Не рекомендуется применять препарат более 2 недель.

Форма выпуска

По 20 таблеток в блистер из ПВХ/Ал. По 2 блистера вместе с инструкцией по применению в пачку картонную. По 25 блистеров вместе с инструкцией по применению в пачку картонную (для стационаров).

Условия хранения:

При температуре не выше 25^{0}С, в сухом месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:
3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек:
Без рецепта.

Производитель
Наброс Фарма Пвт. Лтд.
Н.Х.8,Каджипура, кхеда, Индия.

«Маркетинг и дистрибуция»
ООО «Инновист»
119602 Россия Москва,
Ул.Никулинская,Д.27 корп 2,
Тел: (495) 232-82-79,
Факс: (495) 232-52-52

И.о. директора ИДКЭЛС С. В. Буданов.

Представитель фирмы Шривавстава Амит